

## Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

1. Обследование пациента начинают с применения методов:

Номер правильного ответа: 4

- 1) рентгенологических
- 2) лабораторных
- 3) термометрических
- 4) основных
- 5) цитологических

2. Опрос пациента начинается с выяснения:

Номер правильного ответа: 4

- 1) истории жизни
- 2) анамнеза заболевания
- 3) перенесенных заболеваний
- 4) жалоб
- 5) аллергоанамнеза

3. При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть

Номер правильного ответа: 4

- 1) отклонена назад
- 2) отклонена влево
- 3) отклонена вправо
- 4) наклонена вперед
- 5) отклонена назад и влево

4. Вазоконстрикторы вызывают:

Номер правильного ответа: 2

- 1) расширение сосудов
- 2) сужение сосудов
- 3) гиперемия кожных покровов
- 4) парестезии
- 5) анальгезию

5. Во время коллапса кожные покровы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сухие, бледные
- 2) влажные, бледные
- 3) сухие, гиперемированные
- 4) влажные, гиперемированные
- 5) нормальные

6. С возникновением гиперплазии десны связаны такие факторы, как

Номер правильного ответа: 5

- 1) прием противосудорожных препаратов
- 2) беременность
- 3) лейкопения
- 4) ротовое дыхание
- 5) все перечисленное

7. Противопоказания для проведения местной анестезии на амбулаторном стоматологическом приеме

Номер правильного ответа: 2

- 1) наличие сопутствующего заболевания - сахарный диабет
- 2) непереносимость местного анестетика
- 3) возраст старше 50-ти лет
- 4) наличие сопутствующего заболевания - гипертоническая болезнь (систолическое давление крови более 160мм рт ст)
- 5) разлитой гнойный очаг в мягких тканях лица

8. Целевым пунктом туберальной анестезии является

Номер правильного ответа: 4

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

- 1) подглазничный нерв
- 2) передние верхние альвеолярные нервы
- 3) средние верхние альвеолярные нервы
- 4) задние верхние альвеолярные нервы
- 5) тройничный узел

9. Клиническая смерть диагностируется по следующим признакам:

Номер правильного ответа: 1

- 1) Отсутствие сознания, отсутствие дыхания
- 2) Отсутствие пульса на сонной артерии, отсутствие дыхания
- 3) Отсутствие артериального давления, широкий зрачок, не реагирующий на свет
- 4) Наличие трупных пятен, наличие широкого зрачка не реагирующего на свет
- 5) Синюшность кожных покровов, отсутствие сердцебиения

10. Пациентам группы риска показано использование местноанестезирующего средства не влияющего на тонус сосуда

Номер правильного ответа: 1

- 1) Мепивакаин
- 2) Новокаин
- 3) Лидокаин
- 4) Артикаин
- 5) Анесетезин

11. Электровозбудимость пульпы при воспалении

Номер правильного ответа: 3

- 1) Возрастает
- 2) Остается без изменений
- 3) Снижается
- 4) Колеблется
- 5) Не определяется

12. Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта

Номер правильного ответа: 3

- 1) подкожная
- 2) интубационная
- 3) интралигаментарная
- 4) эпидуральная
- 5) внутривенная

13. Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва

Номер правильного ответа: 4

- 1) кожа и слизистая щеки
- 2) альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти
- 3) альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 4) бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 5) слизистая неба

14. Эффективность профилактики при использовании метода герметизации фиссур составляет (%):

Номер правильного ответа: 5

- 1) 20
- 2) 40
- 3) 60
- 4) 80
- 5) Более 95

15. Степень поражения эмали при очаговой деминерализации можно оценить с помощью

Номер правильного ответа: 3

- 1) зондирования
- 2) электроодонтодиагностики
- 3) витального окрашивания эмали

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

- 4) рентгенологического исследования
- 5) определения индекса Грин-Вермиллиона

16. Основным местным фактором риска возникновения катарального гингивита является  
Номер правильного ответа: 2

- 1) наследственность
- 2) наличие микробного налета
- 3) вредные привычки
- 4) подвижность зубов
- 5) наличие эндокринной патологии

17. Профилактике воспалительных заболеваний пародонта в большей мере способствует  
Номер правильного ответа: 2

- 1) прием фторидсодержащих препаратов
- 2) проведение профессиональной гигиены
- 3) реминерализующая терапия
- 4) уменьшение употребления углеводов
- 5) прием витаминов

18. У какого условного анатомического образования корневого канала необходимо создать апикальный упор?

Номер правильного ответа: 3

- 1) у биологического апекса
- 2) у рентгенологического апекса
- 3) у апикальной констрикции

19. С какой части канала начинается физиологическая облитерация каналов

Номер правильного ответа: 1

- 1) устьевой
- 2) апикальной

20. Деонтология – это

Номер правильного ответа: 1

- 1) учение о долге одного человека перед другим и обществом в целом
- 2) учение о морали
- 3) учение о взаимоотношениях врача и больного

21. Наиболее частой причиной инфаркта миокарда у лиц молодого возраста является

Номер правильного ответа: 5

- 1) тромбоз коронарных артерий
- 2) эмболия
- 3) васкулит
- 4) атеросклероз
- 5) длительный спазм коронарных артерий

22. Тахикардия, нарушение ритма, одышка, боль за грудиной с иррадиацией, неэффективность неоднократного приема нитроглицерина свидетельствуют в пользу

Номер правильного ответа: 4

- 1) пароксизмальной тахикардии
- 2) стенокардии напряжения
- 3) стенокардии покоя
- 4) инфаркта миокарда
- 5) коллапса

23. Фазы большого эпилептического припадка: 1. аура; 2. фаза тонических судорог; 3. фаза клонических судорог; 4. беспричинный смех; 5. беспокойство. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 1

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

24. Употреблением стакана сахаросодержащих напитков можно купировать

Номер правильного ответа: 4

- 1) обморок
- 2) коллапс
- 3) гипергликемию
- 4) гипогликемию
- 5) анафилактический шок

25. Для клинической картины гипогликемии нехарактерен симптом

Номер правильного ответа: 5

- 1) чувства голода
- 2) общей слабости
- 3) влажность кожных покровов
- 4) тремора пальцев
- 5) спутанность сознания, вплоть до его потери

26. Для гипогликемии характерен симптом

Номер правильного ответа: 1

- 1) снижение глюкозы крови
- 2) запах ацетона изо рта
- 3) глубокое, шумное дыхание
- 4) снижение мышечного тонуса
- 5) ацетонурия

27. Для гипергликемии характерен симптом

Номер правильного ответа: 4

- 1) снижение глюкозы крови
- 2) запах ацетона изо рта
- 3) поверхностное дыхание
- 4) диплопия
- 5) ацетонурия

28. Выраженный цианоз, резкая одышка, отсутствие двигательной активности, участие дополнительных мышц в акте дыхания, вздутие шейных вен, выбухание надключичных ямок характеризуют

Номер правильного ответа: 2

- 1) асфиксию обтурационную
- 2) приступ бронхиальной астмы
- 3) большой эпилептический припадок
- 4) приступ стенокардии
- 5) гипервентиляцию

29. Какие лекарства реже других могут вызвать анафилаксию

Номер правильного ответа: 5

- 1) местнообезболивающие
- 2) антибиотики
- 3) витамины
- 4) органические препараты
- 5) вазоконстрикторы

30. Наиболее вероятна анафилаксия в отношении

Номер правильного ответа: 3

- 1) гормонов
- 2) наркотических анальгетиков
- 3) препаратов йода
- 4) транквилизаторов

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

5) витаминов

31. Доминирующим симптомом системной анафилаксии является

Номер правильного ответа: 3

- 1) диссеминированное внутрисосудистое свертывание
- 2) кардиогенный шок
- 3) гипертонический криз
- 4) сосудистый коллапс
- 5) судороги

32. Кто имеет право быть лечащим врачом?

Номер правильного ответа: 3

- 1) обучающийся в высшем медицинском учебном заведении
- 2) обучающийся в образовательном учреждении послевузовского профессионального образования
- 3) окончивший медицинский ВУЗ, интернатуру либо ординатуру и получивший сертификат либо свидетельство об аккредитации

33. При обследовании лимфатических узлов применяют метод:

Номер правильного ответа: 3

- 1) перкуссии
- 2) зондирования
- 3) пальпации
- 4) рентгенографии
- 5) аускультации

34. Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва:

Номер правильного ответа: 4

- 1) кожа и слизистая щеки
- 2) альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти
- 3) альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 4) бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 5) слизистая неба

35. При проведении непрямого массажа сердца руки реаниматора располагаются на:

Номер правильного ответа: 3

- 1) эпигастрии
- 2) ) нижней трети грудины
- 3) средней трети грудины
- 4) яремной вырезки
- 5) боковой поверхности груди

36. Красный плоский лишай проявляется на слизистой оболочке полости рта в виде следующих форм:

Номер правильного ответа: 5

- 1) типичная и эрозивно-язвенная
- 2) гиперкератотическая
- 3) буллезная
- 4) экссудативно-гиперемическая
- 5) все вышеперечисленное

37. Клиническими признаками катарального гингивита являются:

Номер правильного ответа: 3

- 1) кровоточивость десен
- 2) наличие зубного налета, кровоточивость десен
- 3) отек и гиперемия десневого края и межзубных десневых сосочков, кровоточивость десен, отсутствие десневого кармана
- 4) кровоточивость десен, гиперестезия шеек зубов
- 5) гиперестезия шеек зубов

38. К гигиеническим относятся следующие индексы:

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

Номер правильного ответа: 3

- 1) ПИ, ПМА, СРІТN
- 2) Шиллера — Писарева
- 3) Федорова - Володкиной, Грина — Вермильона
- 4) ПИ
- 5) все перечисленные

39. Какую пробу можно выполнить перед лечением для определения непереносимости анестетиков:

Номер правильного ответа: 5

- 1) накожную
- 2) внутрикожную
- 3) подкожную
- 4) внутривенную (ополаскивание)
- 5) никакую

40. В какой форме ультракаина содержится в два раза больше адреналина:

Номер правильного ответа: 3

- 1) ультракаин Д-С
- 2) ультракаин А
- 3) ультракаин Д-С форте +
- 4) ультракаин Д
- 5) ультракаин Е

41. Правовой базой обязательного медицинского страхования являются следующие документы, кроме

Номер правильного ответа: 3

- 1) Закона РФ «О медицинском страховании граждан»
- 2) Основ законодательства об охране здоровья граждан дополнения и изменения к Закону «О медицинском страховании»
- 3) Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

42. К основным методам обследования относятся:

Номер правильного ответа: 2

- 1) опрос, рентгенография
- 2) опрос, осмотр
- 3) осмотр, ЭОД
- 4) ЭОД, рентгенография
- 5) перкуссия, ЭОД

43. Слизистая оболочка полости рта в норме:

Номер правильного ответа: 3

- 1) бледного цвета, сухая
- 2) бледно-розового цвета, сухая
- 3) бледно-розового цвета, равномерно увлажнена
- 4) ярко-красного цвета, обильно увлажнена
- 5) гиперемирована, отечна

44. При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть:

Номер правильного ответа: 4

- 1) отклонена назад
- 2) отклонена влево
- 3) отклонена вправо
- 4) наклонена вперед
- 5) отклонена назад и влево

45. Подвижность зубов определяют с помощью инструмента:

Номер правильного ответа: 3

- 1) зеркала

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

- 2) углового зонда
- 3) пинцета
- 4) шпателя
- 5) экскаватора

46. Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах:

Номер правильного ответа: 2

- 1) интубационная
- 2) проводниковая
- 3) эпидуральная
- 4) внутривенная
- 5) масочная

47. Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через:

Номер правильного ответа: 1

- 1) овальное отверстие
- 2) круглое отверстие
- 3) подглазничное отверстие
- 4) верхнеглазничную щель
- 5) нижнечелюстной канал

48. Местным осложнением при обезболивании является:

Номер правильного ответа: 2

- 1) обморок
- 2) контрактура нижней челюсти
- 3) анафилактический шок
- 4) коллапс
- 5) отек Квинке

49. Общим осложнением при обезболивании является:

Номер правильного ответа: 3

- 1) кровотечение
- 2) контрактура
- 3) обморок
- 4) некроз
- 5) гематома

50. Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва:

Номер правильного ответа: 4

- 1) кожа и слизистая щеки
- 2) альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти
- 3) альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 4) бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 5) слизистая неба

51. Анафилактический шок преимущественно развивается на фоне:

Номер правильного ответа: 4

- 1) диатеза
- 2) интоксикации
- 3) хронического панкреатита
- 4) перенесенной ранее аллергической реакции
- 5) атеросклероза

52. В целях профилактики кариеса у детей следует ограничить в рационе питания:

Номер правильного ответа: 3

- 1) кисломолочные продукты
- 2) зелень, овощи
- 3) мясные консервы
- 4) рыбные продукты
- 5) сыры

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

53. Для профилактической обработки эмали прорезавшихся постоянных зубов у кариесвосприимчивых детей применяется:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сафарейт
- 2) фторлак
- 3) 2% раствор метиленового синего
- 4) 40% раствор глюкозы
- 5) р-р Шиллера-Писарева

54. Для запечатывания фиссур постоянных зубов применяют:

Номер правильного ответа: 3

- 1) силидонт
- 2) компомеры
- 3) силанты
- 4) амальгаму
- 5) силиции

55. Заболевания, являющиеся наследственными:

Номер правильного ответа: 3

- 1) флюороз
- 2) системная гипоплазия эмали
- 3) несовершенный амелогенез
- 4) «тетрациклиновые» зубы
- 5) местная гипоплазия эмали

56. Основная причина системной гипоплазии эмали постоянных зубов:

Номер правильного ответа: 4

- 1) наследственный фактор
- 2) заболевания матери в период беременности
- 3) травма плода
- 4) заболевания ребенка на первом году жизни
- 5) множественный кариес молочных зубов

57. Доза фтора в питьевой воде, при которой развивается деструктивная форма флюороза (мг/л):

Номер правильного ответа: 5

- 1) 0,5
- 2) 1
- 3) 2-3
- 4) 4-6
- 5) 7-9 и выше

58. В качестве лечебных прокладок при глубоком кариесе применяют:

Номер правильного ответа: 1

- 1) прокладки на основе гидроокиси кальция
- 2) пасту с гормональными препаратами
- 3) пасту с антибиотиками
- 4) дентин
- 5) форфенан

59. Стеклоиономерные цементы используют при лечении среднего кариеса зубов:

Номер правильного ответа: 5

- 1) только молочных несформированных
- 2) только молочных сформированных
- 3) только постоянных несформированных
- 4) только постоянных сформированных
- 5) всех молочных и постоянных зубов

60. Поверхностное зондирование пульпы безболезненно при пульпите:

Номер правильного ответа: 2

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

- 1) хроническом фиброзном
- 2) хроническом гангренозном
- 3) хроническом гипертрофическом
- 4) хроническом в стадии обострения
- 5) остром очаговом

61. При хроническом гипертрофическом пульпите жалобы больного на боли:

Номер правильного ответа: 3

- 1) самопроизвольные
- 2) постоянные
- 3) при попадании пищи, в сочетании с кровоточивостью
- 4) иррадиирующие
- 5) от температурных раздражителей

62. Симптомы, характерные для острого диффузного пульпита:

Номер правильного ответа: 1

- 1) боли самопроизвольные, ночные, приступообразные, длительные, с короткими светлыми промежутками, иррадиирующие
- 2) боли постоянные, усиливающиеся при накусывании на зуб
- 3) переходная, складка свободная, безболезненная при пальпации
- 4) боли от раздражителей, приступообразные, с короткими болевыми приступами и длительными светлыми промежутками, локальные
- 5) боли и кровоточивость при попадании пищи в кариозную полость

63. Ведущим методом для определения формы хронического периодонтита является:

Номер правильного ответа: 2

- 1) ЭОД
- 2) рентгенологический
- 3) трансиллюминационный
- 4) определение индекса РМА
- 5) цвет коронки зуба

64. Рациональная тактика при хроническом периодонтите молочных зубов у ребенка, страдающего пиелонефритом:

Номер правильного ответа: 3

- 1) применение резорцин-формалинового метода
- 2) пломбирование каналов пастой на масляной основе
- 3) удаление зуба
- 4) пломбирование каналов пастой на основе гидроокиси кальция
- 5) пломбирование каналов резорцин-формалиновой пастой

65. Основной критерий эффективности лечения периодонтита постоянных зубов:

Номер правильного ответа: 4

- 1) отсутствие подвижности
- 2) отсутствие боли при накусывании
- 3) отсутствие рецидивов воспаления
- 4) восстановление структуры костной ткани на рентгенограмме
- 5) отсутствие свища на десне

66. Изменения костной ткани межзубных перегородок на рентгенограммах выявляются при:

Номер правильного ответа: 2

- 1) генерализованном гингивите
- 2) локальном пародонтите
- 3) локальном и генерализованном гингивите
- 4) атрофическом гингивите
- 5) гипертрофическом гингивите

67. Лечение хронического катарального гингивита:

Номер правильного ответа: 2

- 1) гигиена полости рта, удаление зубных отложений, склерозирующие средства, физиотерапия

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

- 2) гигиена полости рта, удаление зубных отложений, наложение лечебных повязок
- 3) гигиена полости рта, устранение местных факторов (коррекция уздечек, пластика преддверия полости рта и др.), электрофорез витаминами, все виды массажа
- 4) обезболивание, снятие зубных отложений, аппликации протеолитическими ферментами, антибактериальные средства
- 5) обезболивание, массаж, смазывание десен кератопластиками

68. Клинические признаки при неполном вывихе временного и постоянного зуба в первые дни после травмы:

Номер правильного ответа: 3

- 1) зуб погружен в лунку до десны, подвижность зуба II-III степени
- 2) лунка зуба пустая
- 3) коронка смещена в различном направлении
- 4) видимая часть коронки без изменения, незначительная подвижность
- 5) укорочение видимой части коронки, подвижности нет

69. При проведении процедуры покрытия зубов фторлаком первой проводится манипуляция:

Номер правильного ответа: 1

- 1) очищение зубов от налета
- 2) нанесение фторлака
- 3) высушивание зубов
- 4) изоляция от слюны
- 5) протравливание эмали

70. Осматривать ребенка раннего возраста, имеющего здоровую полость рта - "факторы риска", находящегося на диспансерном учете у стоматологов необходимо

Номер правильного ответа: 2

- 1) один раз в год
- 2) диспансерный осмотр 2 раза в год
- 3) диспансерный осмотр по показаниям, но не реже 2 раз в год
- 4) диспансерный осмотр 3 раза в год
- 5) диспансерный осмотр по показаниям, но не реже 3 раз в год

71. Укажите модель диспансерного наблюдения для ребенка дошкольного возраста, имеющего здоровую полость рта

Номер правильного ответа: 1

- 1) диспансерный осмотр 1 раз в год
- 2) диспансерный осмотр 2 раза в год
- 3) диспансерный осмотр 3 раза в год
- 4) диспансерный осмотр по показаниям
- 5) диспансерные осмотры не целесообразны

72. Укажите модель диспансерного наблюдения для ребенка дошкольного возраста, имеющего кариес зубов

Номер правильного ответа: 5

- 1) диспансерный осмотр 1 раз в год
- 2) диспансерный осмотр 2 раза в год
- 3) диспансерный осмотр 3 раза в год
- 4) диспансерный осмотр 4 раза в год
- 5) диспансерные осмотры по показаниям с учетом формы активности кариеса

73. Укажите модель диспансерного наблюдения для ребенка дошкольного возраста, имеющего порок развития, осложнений и сочетающийся с кариесом

Номер правильного ответа: 3

- 1) диспансерный осмотр 1 раз в год
- 2) диспансерный осмотр 2 раза в год
- 3) диспансерный осмотр 3 раза в год
- 4) диспансерный осмотр по показаниям
- 5) диспансерные осмотры с учетом формы активности кариеса

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

74. Укажите модель диспансерного наблюдения для школьника, имеющего III степень активности кариеса

Номер правильного ответа: 5

- 1) диспансерный осмотр 1 раз в год
- 2) диспансерный осмотр 2 раза в год
- 3) диспансерный осмотр 3 раза в год
- 4) диспансерный осмотр по показаниям
- 5) диспансерный осмотр 3 раза в год, через каждые 3-4 месяца

75. Для оценки эффективности работы врача, работающего в школе 5 лет, главным является

Номер правильного ответа: 1

- 1) количество пломб, поставленных в новые кариозные полости
- 2) нуждаемость в лечении
- 3) общее количество пломб в день
- 4) охват плановой санации
- 5) комплекс перечисленных показателей

76. Обязательными мероприятиями при осуществлении стоматологической диспансеризации школьников являются

Номер правильного ответа: 3

- 1) прием детей по обращаемости
- 2) сплошная двухразовая санация детей, начиная с первого класса
- 3) распределение детей на диспансерные группы с учетом степени активности кариеса 1 раз в году
- 4) перевод детей из одной диспансерной группы в другую при каждом диспансерном осмотре
- 5) ежемесячная оценка эффективности диспансеризации

77. Осуществлять диспансерное наблюдение детей с нарушениями функций (речи, дыхания, жевания, глотания) в организованных детских коллективах целесообразнее

Номер правильного ответа: 3

- 1) заведующему детским стоматологическим отделением
- 2) врачу-стоматологу амбулаторного поликлинического приема
- 3) детскому врачу-стоматологу, осуществляющему санацию организованных детских коллективов
- 4) детскому стоматологу-ортодонту
- 5) специально выделенному детскому врачу-стоматологу профилактического отделения

78. Как следует проводить очистку, обработку и стерилизацию стоматологического инструмента после проведения гнойных манипуляций?

Номер правильного ответа: 5

- 1) достаточно дезинфекции
- 2) необходима дезинфекция с последующей стерилизацией
- 3) необходима предстерилизационная подготовка и стерилизация
- 4) достаточно только стерилизации
- 5) обязательное проведение дезинфекции, предстерилизационной подготовки и стерилизации

79. Как следует проводить очистку, обработку и стерилизацию стоматологических наконечников?

Номер правильного ответа: 5

- 1) обязательная стерилизация
- 2) достаточно дезинфекции
- 3) необходима предстерилизационная подготовка с последующей дезинфекцией
- 4) обязательная дезинфекция и стерилизация
- 5) стерилизация с предварительной предстерилизационной подготовкой

80. Экстренной личной профилактикой врача-стоматолога при подозрении на СПИД у пациента является

Номер правильного ответа: 5

- 1) закапать в глаза альбуцид
- 2) закапать в нос 1% раствор протаргола
- 3) прополоскать рот и нос 0.05% раствором марганцевокислого калия
- 4) обработать руки 70° спиртом
- 5) использовать комплекс вышеуказанных мер

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

81. Пульпа формируется

Номер правильного ответа: 2

- 1) из мезенхимы зубного мешочка
- 2) из мезенхимы зубного сосочка
- 3) из эпителиальной ткани, образующей внутренний слой эмалевого органа
- 4) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа
- 5) из передней половины эпителиальной пластинки

82. Дентин формируется

Номер правильного ответа: 2

- 1) из мезенхимы зубного мешочка
- 2) из мезенхимы зубного сосочка
- 3) из эпителиальной ткани, образующей внутренний слой эмалевого органа
- 4) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа
- 5) из передней половины эпителиальной пластинки

83. Цемент корня зуба формируется

Номер правильного ответа: 1

- 1) из мезенхимы зубного мешочка
- 2) из мезенхимы зубного сосочка
- 3) из эпителиальной ткани, образующей верхний слой эмалевого органа
- 4) из передней половины эпителиальной пластинки
- 5) из эпителиального влагалища

84. Периодонт формируется

Номер правильного ответа: 1

- 1) из мезенхимы зубного мешочка
- 2) из мезенхимы зубного сосочка
- 3) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа
- 4) из эпителиальной ткани, образующей внутренний слой эмалевого органа
- 5) из передней половины эпителиальной пластинки

85. Эмаль зуба формируется

Номер правильного ответа: 3

- 1) из мезенхимы зубного мешочка
- 2) из мезенхимы зубного сосочка
- 3) из эпителиальных клеток, образующих внутренний слой эмалевого органа
- 4) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа

86. Насмитова оболочка формируется

Номер правильного ответа: 4

- 1) из мезенхимы зубного мешочка
- 2) из мезенхимы зубного сосочка
- 3) из эпителиальной ткани, образующей внутренний слой эмалевого органа
- 4) из эпителиальной ткани, образующей наружный слой эмалевого органа

87. Минерализация 51,61,71,81 зубов начинается

Номер правильного ответа: 2

- 1) на 2-3 месяце утробной жизни
- 2) на 4-5 месяце утробной жизни
- 3) на 6-7 месяце утробной жизни
- 4) на 7-8 месяце утробной жизни
- 5) на 8-9 месяце утробной жизни

88. Минерализация 54,64,74,84 зубов начинается

Номер правильного ответа: 2

- 1) на 3-м месяце утробной жизни
- 2) на 5-м месяце утробной жизни
- 3) на 6-м месяце утробной жизни

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

- 4) на 7-м месяце утробной жизни
- 5) на 8-м месяце утробной жизни

89. Зубы 51,61,71,81 прорезываются

Номер правильного ответа: 3

- 1) на 4-5 месяце жизни ребенка
- 2) на 5-6 месяце жизни ребенка
- 3) на 6-8 месяце жизни ребенка
- 4) на 9-10 месяце жизни ребенка
- 5) на 11-12 месяце жизни ребенка

90. Зубы 52,62,72,82 прорезываются

Номер правильного ответа: 3

- 1) на 2-5 месяце жизни ребенка
- 2) на 6-12 месяце жизни ребенка
- 3) на 7-8 месяце жизни ребенка
- 4) на 12-17 месяце жизни ребенка
- 5) на 17-20 месяце жизни ребенка

91. Формирование корней 54,64,74,84 зубов заканчивается

Номер правильного ответа: 3

- 1) в возрасте ребенка 2-3 года
- 2) в возрасте ребенка 3-4 года
- 3) в возрасте ребенка 4-5 лет
- 4) в возрасте ребенка 5-6 лет
- 5) в возрасте ребенка 6-7 лет

92. Формирование корней 55,65,75,85 зубов заканчивается

Номер правильного ответа: 2

- 1) в возрасте ребенка 3 года
- 2) в возрасте ребенка 4 года
- 3) в возрасте ребенка 5 лет
- 4) в возрасте ребенка 6 лет
- 5) в возрасте ребенка 7 лет

93. Сроки максимального рассасывания корней 51,61,71,81 зубов

Номер правильного ответа: 4

- 1) в возрасте ребенка 3-3.5 года
- 2) в возрасте ребенка 4-4.5 года
- 3) в возрасте ребенка 5-5.5 лет
- 4) в возрасте ребенка 5.5-6.5 лет
- 5) в возрасте ребенка 6.5-7 лет

94. Сроки максимального рассасывания корней 52,62,72,82 зубов

Номер правильного ответа: 4

- 1) в возрасте ребенка 3-4 лет
- 2) в возрасте ребенка 4-5 лет
- 3) в возрасте ребенка 5-6 лет
- 4) в возрасте ребенка 5.5-7 лет
- 5) в возрасте ребенка 8 лет

95. Сроки максимального рассасывания корней 55,65,75,85 зубов

Номер правильного ответа: 5

- 1) в возрасте ребенка 6-7 лет
- 2) в возрасте ребенка 8-8.5 лет
- 3) в возрасте ребенка 9-9.5 лет
- 4) в возрасте ребенка 9-10 лет
- 5) в возрасте ребенка 10-11 лет

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

96. В детской стоматологии применяются нижеперечисленные методики рентгенологического исследования

Номер правильного ответа: 5

- 1) телерентгенография
- 2) ортопантомография
- 3) панорамная рентгенография
- 4) внутриротовая рентгенография
- 5) все перечисленные выше методики

97. В течение первого года жизни ребенок 3-й диспансерной группы (имеющих этиологические факторы развития зубочелюстных аномалий) должен быть осмотрен

Номер правильного ответа: 3

- 1) 1 раз в год
- 2) 2 раза в год
- 3) 3 раза в год
- 4) 4 раза в год
- 5) более 4 раз в год

98. При ранней потере временных зубов с целью профилактики деформаций зубных рядов необходимо

Номер правильного ответа: 3

- 1) стимулировать прорезывание постоянных зубов
- 2) сошлифовать нестершиеся бугры временных зубов
- 3) зубное протезирование
- 4) назначить потребление жесткой пищи
- 5) назначить массаж

99. Профилактическими мероприятиями, которые необходимо проводить в период развития ребенка с целью профилактики антенатальных пороков зубов, являются

Номер правильного ответа: 5

- 1) назначение сбалансированного режима питания будущей матери
- 2) ограничение применения лекарств в период беременности
- 3) определение щадящего режима работы беременной женщины
- 4) устранение вредных привычек
- 5) все перечисленные факторы

100. Наиболее эффективным упражнением для коррекции смыкания губ является

Номер правильного ответа: 3

- 1) сжатие зубных рядов
- 2) выдвижение нижней челюсти
- 3) последовательное напряжение и расслабление губ
- 4) надувание нижней губы
- 5) надавливание языком в область переднего участка твердого неба

101. Миогимнастика при лечении дистального прикуса назначается

Номер правильного ответа: 5

- 1) для мышц подбородка
- 2) для круговой мышцы рта
- 3) для мышц, поднимающих нижнюю челюсть
- 4) для жевательных мышц
- 5) для мышц, участвующих в перемещении нижней челюсти вперед

102. С целью профилактики аномалий прикуса у детей необходимо обратить внимание родителей

Номер правильного ответа: 5

- 1) на тренировку носового дыхания
- 2) на правильное положение головы
- 3) на воспитание правильного навыка пережевывания пищи
- 4) на воспитание навыка откусывания пищи передними зубами
- 5) все перечисленное

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

103. В работу воспитателей детского дошкольного учреждения следует включить

Номер правильного ответа: 5

- 1) тренировку правильного положения головы
- 2) тренировку носового дыхания
- 3) обучение навыку спокойного смыкания губ
- 4) тренировку правильного глотания
- 5) все перечисленное

104. В комплекс упражнений по лечебной физкультуре для детей, имеющих аномалии прикуса, детский стоматолог должен включить

Номер правильного ответа: 5

- 1) тренировку правильного положения головы
- 2) тренировку мышц, перемещающих нижнюю челюсть вперед
- 3) упражнения для мышц челюстно-лицевой области
- 4) упражнения с приспособлениями для миотерапии
- 5) все перечисленное

105. Ребенок, больной острым герпетическим стоматитом, не является распространителем вируса

Номер правильного ответа: 2

- 1) после полной эпителизации всех высыпаний
- 2) через 5 дней после последних высыпаний
- 3) в период остаточного гингивита
- 4) после угасания лимфаденита
- 5) в любой из перечисленных периодов

106. В меньшей степени подвержены риску заражения ОГС

Номер правильного ответа: 4

- 1) дети старше 3 лет
- 2) брюнеты
- 3) дети, естественно вскармливающиеся до 1 года жизни
- 4) все названные
- 5) ни один из названных

107. Причиной острого герпетического стоматита является

Номер правильного ответа: 1

- 1) вирус герпеса
- 2) вирусно-микробные ассоциации полости рта
- 3) микрофлора полости рта, приобретающая патогенные свойства при снижении реактивности организма
- 4) вирусная Мих.инфекция
- 5) не названа

108. Скос иглы при инъекционном обезболивании направляется к кости под углом (в градусах):

Номер правильного ответа: 4

- 1) 90
- 2) 6070
- 3) 5055
- 4) 3045
- 5) 1020

109. В зону обезболивания верхней челюсти при инфраорбитальной анестезии входят:

Номер правильного ответа: 4

- 1) моляры
- 2) верхняя губа, крыло носа
- 3) 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, слизистая оболочка альвеолярного отростка с небной стороны
- 4) 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, слизистая оболочка альвеолярного отростка с вестибулярной стороны
- 5) слизистая оболочка неба

110. Во время коллапса кожные покровы:

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

Номер правильного ответа: 2

- 1) сухие, бледные
- 2) влажные, бледные
- 3) сухие, гиперемированные
- 4) влажные, гиперемированные
- 5) нормальные

111. Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах:

Номер правильного ответа: 2

- 1) интубационная
- 2) проводниковая
- 3) эпидуральная
- 4) внутривенная
- 5) масочная

112. Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта:

Номер правильного ответа: 3

- 1) подкожная
- 2) интубационная
- 3) интралигаментарная
- 4) эпидуральная
- 5) внутривенная

113. Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания:

Номер правильного ответа: 1

- 1) аллергические реакции на анестетики
- 2) множественный кариес зубов
- 3) высокая температура
- 4) подвижность зубов
- 5) повышенное АД

114. При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную анестезию:

Номер правильного ответа: 1

- 1) инфильтрационную
- 2) торусальную
- 3) резцовую
- 4) мандибулярную
- 5) ментальную

115. При удалении моляров верхней челюсти применяют местную анестезию:

Номер правильного ответа: 3

- 1) торусальную
- 2) инфраорбитальную
- 3) туберальную
- 4) ментальную
- 5) резцовую

116. При удалении резцов нижней челюсти применяется анестезия:

Номер правильного ответа: 3

- 1) палатинальная
- 2) инфраорбитальная
- 3) инфильтрационная с оральной и вестибулярной стороны
- 4) резцовая и инфильтрационная с вестибулярной стороны
- 5) туберальная

117. При удалении премоляров нижней челюсти применяется анестезия:

Номер правильного ответа: 3

- 1) инфильтрационная
- 2) резцовая
- 3) торусальная

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

- 4) палатинальная
- 5) туберальная

118. При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия:

Номер правильного ответа: 4

- 1) инфильтрационная
- 2) туберальная
- 3) ментальная
- 4) по Гоу-Гейтсу
- 5) палатинальная

119. Подъязычный нерв иннервирует:

Номер правильного ответа: 3

- 1) зубы верхней челюсти
- 2) слизистую оболочку неба
- 3) слизистую оболочку десны с язычной стороны
- 4) нижнюю губу и кожу подбородочной области
- 5) слизистую щеки

120. Анестетики на основе мепивакаина относятся к группе:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сложных эфиров
- 2) амидов
- 3) щелочей
- 4) спиртов
- 5) кислот

121. Местным осложнением при проводниковом обезболивании является:

Номер правильного ответа: 1

- 1) гематома
- 2) коллапс
- 3) обморок
- 4) анафилактический шок
- 5) отек Квинке

122. Нижний луночковый нерв иннервирует:

Номер правильного ответа: 2

- 1) зубы верхней челюсти
- 2) зубы нижней челюсти
- 3) подъязычную область
- 4) 2/3 языка
- 5) слизистую щеки

123. В зону иннервации ментального нерва входят:

Номер правильного ответа: 3

- 1) моляры
- 2) альвеолярный отросток в области моляров
- 3) подбородок, губа, резцы, клыки и премоляры нижней челюсти
- 4) костная ткань ветви нижней челюсти
- 5) верхняя губа

124. Подбородочный нерв блокируется при анестезии:

Номер правильного ответа: 1

- 1) мандибулярной и ментальной
- 2) резцовой и инфраорбитальной
- 3) резцовой и туберальной
- 4) туберальной и палатинальной
- 5) инфраорбитальной и палатинальной

125. Нижний луночковый нерв блокируется при анестезии:

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

Номер правильного ответа: 1

- 1) мандибулярной
- 2) ментальной
- 3) инфраорбитальной
- 4) туберальной
- 5) палатинальной

126. Задние верхние альвеолярные нервы исключаются анестезией:

Номер правильного ответа: 4

- 1) мандибулярной
- 2) ментальной
- 3) инфраорбитальной
- 4) туберальной
- 5) торусапной

127. Передние и средние верхние альвеолярные нервы исключаются анестезией:

Номер правильного ответа: 3

- 1) мандибулярной
- 2) торусальной
- 3) инфраорбитальной
- 4) туберальной
- 5) по Гоу-Гейтсу

128. В зону иннервации язычного нерва входит:

Номер правильного ответа: 2

- 1) задняя треть языка
- 2) передние 2/3 языка
- 3) слизистая оболочка глотки
- 4) слизистая оболочка переходной складки
- 5) кончик языка

129. Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва:

Номер правильного ответа: 4

- 1) кожа и слизистая щеки
- 2) альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти
- 3) альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 4) бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 5) слизистая неба

130. Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии:

Номер правильного ответа: 1

- 1) торусальной
- 2) туберальной
- 3) ментальной
- 4) инфраорбитальной
- 5) палатинальной

131. Зона иннервации средних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва:

Номер правильного ответа: 4

- 1) премоляры нижней челюсти
- 2) моляры верхней челюсти
- 3) моляры нижней челюсти
- 4) премоляры верхней челюсти
- 5) резцы верхней челюсти

132. В зону иннервации передних верхних альвеолярных ветвей подглазничного нерва входят зубы:

Номер правильного ответа: 1

- 1) фронтальные верхней челюсти
- 2) фронтальные нижней челюсти,

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

- 3) жевательные верхней челюсти
- 4) жевательные нижней челюсти
- 5) премоляры нижней челюсти

133. В зону иннервации нижнелуночкового нерва входят:

Номер правильного ответа: 2

- 1) зубы верхней челюсти
- 2) зубы нижней челюсти
- 3) передние 2/3 языка
- 4) небо
- 5) слизистая щеки

134. К методу инфильтрационной анестезии относится:

Номер правильного ответа: 2

- 1) мандибулярная
- 2) субпериостальная
- 3) инфраорбитальная
- 4) резцовая
- 5) ментальная

135. При общем обезболивании происходит:

Номер правильного ответа: 1

- 1) обратимое торможение ЦНС
- 2) необратимое торможение ЦНС
- 3) блокада периферических нервных рецепторов
- 4) блокада основного нервного ствола
- 5) возбуждение ЦНС

136. Для премедикации применяют препараты:

Номер правильного ответа: 1

- 1) малые транквилизаторы, анальгетики, гипосенсибилизирующие вещества
- 2) малые транквилизаторы, антибиотики, гипосенсибилизирующие вещества
- 3) малые транквилизаторы, диуретики, спазмолитики
- 4) малые транквилизаторы, диуретики, спазмолитики, гипосенсибилизирующие вещества
- 5) анальгетики, антибиотики

137. Вазоконстрикторы вызывают:

Номер правильного ответа: 2

- 1) расширение сосудов
- 2) сужение сосудов
- 3) гиперемиию кожных покровов
- 4) парестезии
- 5) анальгезию

138. Депо анестетика при мандибулярной анестезии создают у отверстия:

Номер правильного ответа: 4

- 1) большого небного
- 2) резцового
- 3) подглазничного
- 4) нижнечелюстного
- 5) подбородочного

139. Для удаления зубов применяются инструменты:

Номер правильного ответа: 3

- 1) зеркало, пинцет
- 2) пинцет, зонд
- 3) элеватор, щипцы
- 4) шпатель, пинцет
- 5) зеркало, зонд

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

140. Показанием к срочному удалению зуба является:

Номер правильного ответа: 4

- 1) дистопированные зубы
- 2) хронический пульпит
- 3) разрушение коронки зуба
- 4) некупируемое гнойное воспаление в периодонте
- 5) подвижность зуба 3 степени

141. Показанием к плановому удалению зуба является:

Номер правильного ответа: 3

- 1) острый остеомиелит
- 2) острый периостит
- 3) подвижность зуба 3 степени
- 4) хронический пульпит
- 5) острый пульпит

142. Первым движением при удалении шестого зуба верхней челюсти является:

Номер правильного ответа: 3

- 1) ротация
- 2) люксация и ротация
- 3) люксация в небную сторону
- 4) люксация в щечную сторону
- 5) люксация в обе стороны

143. Для удаления моляров на нижней челюсти при затрудненном открывании полости рта применяются:

Номер правильного ответа: 1

- 1) щипцы изогнутые по плоскости
- 2) клювовидные щипцы со сходящимися щечками
- 3) клювовидные щипцы с шипами
- 4) элеватор Леклюза
- 5) байонетные щипцы

144. Непосредственным общим осложнением местной анестезии является:

Номер правильного ответа: 1

- 1) обморок
- 2) гематома
- 3) контрактура
- 4) кровотечение
- 5) пародонтит

145. Обморок - это:

Номер правильного ответа: 3

- 1) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
- 2) аллергическая реакция на антиген
- 3) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
- 4) гипертонус мышц
- 5) дыхательная недостаточность

146. При передозировке адреналина больному необходимо ввести:

Номер правильного ответа: 1

- 1) внутривенно 1 мл атропина
- 2) внутривенно 1 мл мезатона
- 3) внутримышечно 1 мл норадреналина
- 4) внутримышечно баралгин
- 5) внутривенно героин

147. Коллапс - это:

Номер правильного ответа: 3

- 1) аллергическая реакция на антиген

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Вторая категория.

- 2) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
- 3) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
- 4) гипертонус мышц
- 5) дыхательная недостаточность

148. Прием Геймлиха применяется при каких ситуациях

Номер правильного ответа: 1

- 1) Обструкция верхних дыхательных путей и отсутствие рефлекторного кашля, либо кашель не эффективен
- 2) Травме позвоночника
- 3) Инспираторной одышке
- 4) Астматическом статусе

149. Сколько по времени необходимо проводить сердечно-легочную реанимацию

Номер правильного ответа: 3

- 1) 10 минут
- 2) 30 минут
- 3) До приезда бригады скорой помощи
- 4) Пока есть силы у людей оказывающих неотложную помощь

150. Кто должен проводить сердечно -легочную реанимацию в стоматологической клинике

Номер правильного ответа: 4

- 1) Администратор
- 2) Заведующий отделением
- 3) Главный врач
- 4) Врач и м/с, на приеме у которых произошло неотложное состояние