

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

1. При отломе коронки резца с обнажением пульпы у ребенка 13 лет показана следующая методика лечения

Номер правильного ответа: 2

- 1) витальная ампутация коронковой пульпы
- 2) метод прижизненной экстирпации
- 3) наложение на обнаженную пульпу одонтотропной пасты и защитной коронки
- 4) изготовление ортодонтической коронки
- 5) глубокая ампутация пульпы

2. Предпочтительным методом лечения при отломе части коронки 11,21 в результате травмы с обнажением пульпы у ребенка 7 лет является

Номер правильного ответа: 2

- 1) биологический метод
- 2) метод прижизненной ампутации
- 3) витальная экстирпация
- 4) девитальная ампутация
- 5) девитальная экстирпация

3. Тактика лечения неполного вывиха временного зуба с повреждением сосудисто-нервного пучка

Номер правильного ответа: 2

- 1) депульпировать поврежденный зуб, фиксировать
- 2) в зависимости от возраста и степени формирования или резорбции корня выбрать тактику лечения
- 3) обязательно проводить экстракцию поврежденного зуба
- 4) только депульпировать и дать рекомендации
- 5) ни один из вышеперечисленных

4. Какие рекомендации необходимо дать родителям ребенка 1.5 лет, имеющему пятна и множественные дефекты твердых тканей на фронтальных зубах

Номер правильного ответа: 2

- 1) обычная гигиена полости рта
- 2) гигиена полости рта с кальцийсодержащим раствором
- 3) рациональное употребление углеводов
- 4) прием фторсодержащих таблеток
- 5) гигиена полости рта с фторсодержащей пастой

5. В каких случаях при наличии на эмали зубов показана ремтерапия?

Номер правильного ответа: 4

- 1) флюороз
- 2) мраморная эмаль
- 3) гипоплазия системная
- 4) очаговая деминерализация
- 5) гипоплазия местная (очаговая)

6. Наиболее прочно герметизирует фиссуры

Номер правильного ответа: 3

- 1) амальгама
- 2) стеклоиономерный цемент
- 3) композиционный материал
- 4) фтористый фосфат-цемент
- 5) твердеющий лак

7. Укажите наиболее простую и эффективную методику подготовки зубов к аппликационной терапии

Номер правильного ответа: 3

- 1) гигиеническая обработка зубов специальным абразивным порошком
- 2) обработка зубов 2% раствором перекиси водорода
- 3) гигиеническая обработка зубов с помощью зубной щетки и пасты
- 4) гигиеническая обработка зубов специальными приспособлениями и инструментами
- 5) все перечисленные выше

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

8. Назовите наиболее целесообразный период для первичной эндогенной профилактики кариеса молочных резцов

Номер правильного ответа: 1

- 1) антенатальный период
- 2) первое полугодие жизни
- 3) второе полугодие 1-го года жизни
- 4) второй год жизни
- 5) не имеет значения

9. Реагенты для определения гигиенического индекса

Номер правильного ответа: 5

- 1) метиленовый синий
- 2) иодсодержащий раствор
- 3) таблетки с красителем
- 4) фуксин
- 5) любой из перечисленных

10. Срок службы зубной щетки

Номер правильного ответа: 5

- 1) 2 месяца
- 2) 4 месяца
- 3) 6 месяцев
- 4) 1 год
- 5) определяется индивидуально

11. При очаговой деминерализации наиболее показано

Номер правильного ответа: 4

- 1) препаровка деминерализованной эмали и пломбирование
- 2) сошлифовка деминерализованной эмали
- 3) сошлифовка деминерализованной эмали и покрытие этого участка ремпрепаратом
- 4) реминерализирующая терапия
- 5) чистка зубов лечебно-профилактическими зубными пастами

12. Показанием к покрытию зубов фторсодержащими лаками в лечебных целях является

Номер правильного ответа: 2

- 1) флюороз
- 2) очаговая деминерализация
- 3) очаговая гипоплазия
- 4) поверхностный кариес
- 5) несовершенный энамелогенез

13. Покрыть зубы фторсодержащими лаками в лечебных целях нужно

Номер правильного ответа: 4

- 1) ежедневно в течение 12-15 дней
- 2) один раз в месяц
- 3) один раз в год
- 4) определяется индивидуально
- 5) три-четыре сеанса с недельным интервалом

14. Покрытие зубов фторсодержащими лаками в целях первичной профилактики показано

Номер правильного ответа: 2

- 1) временные зубы в 5-6 лет
- 2) временные и постоянные зубы на 1-3 году после прорезывания
- 3) постоянные зубы в 12-15 лет
- 4) все зубы, имеющиеся во рту при сменном прикусе
- 5) определяется индивидуально

15. Показанием к герметизации фиссур является

Номер правильного ответа: 5

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

- 1) возраст ребенка
- 2) глубина фиссур
- 3) форма фиссур
- 4) "возраст" зуба
- 5) все перечисленное

16. Факторы риска кариеса зубов определяются

Номер правильного ответа: 5

- 1) с помощью анамнеза
- 2) РН-метрия, гигиенический индекс, вязкость слюны и др.
- 3) клиническое обследование
- 4) аппаратурные методы исследования
- 5) определяются индивидуально

17. Гигиеническое обучение и воспитание (ГО и В) необходимо начинать

Номер правильного ответа: 4

- 1) с начала прорезывания первых постоянных зубов (5-6 лет)
- 2) со времени прорезывания всех постоянных зубов (12-13 лет)
- 3) в возрасте 3-4 года
- 4) с двух лет
- 5) в возрасте прорезывания первых временных зубов

18. Наиболее эффективной методикой для профилактики кариеса фиссур является

Номер правильного ответа: 5

- 1) герметизация композиционными материалами
- 2) герметизация амальгамами
- 3) герметизация фторсодержащим цементом
- 4) покрытие фторлаком
- 5) определяется индивидуально

19. Какие средства гигиены вы назначите младшему школьнику с интактными зубами, живущему в местности с оптимальным содержанием фтора в питьевой воде?

Номер правильного ответа: 3

- 1) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фтор
- 2) гигиенический зубной порошок
- 3) гигиеническую зубную пасту
- 4) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую фосфорно-кальциевые соли
- 5) лечебно-профилактическую зубную пасту, содержащую экстракт лечебных трав

20. Какие средства гигиены вы назначите ребенку с третьей степенью активности кариеса?

Номер правильного ответа: 2

- 1) солевые зубные пасты
- 2) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие соединения фтора
- 3) лечебно-профилактические зубные пасты, содержащие экстракты лечебных трав
- 4) гигиенические зубные пасты-эликсир
- 5) не имеет значения

21. При каком заболевании в комплексе проводимых лечебных мероприятий обязательным является осуществление профессиональной гигиены полости рта?

Номер правильного ответа: 5

- 1) очаговая деминерализация
- 2) III степень активности кариеса
- 3) генерализованный пародонтит
- 4) зубочелюстные аномалии (ребенок находится на лечении у ортодонта)
- 5) при всех вышеперечисленных

22. Противопоказаниями к работе турбинной бормашиной являются

Номер правильного ответа: 3

- 1) вскрытие пульповой камеры при периодонтите
- 2) вскрытие пульповой камеры при пульпите

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

- 3) препарирование дна и стенок кариозной полости с живой пульпой без водяного охлаждения
- 4) удаление нависающих краев кариозной полости с живой пульпой
- 5) удаление пломбы

23. Наиболее эффективными методами лечения гипоплазии твердых тканей фронтальных постоянных зубов у детей являются

Номер правильного ответа: 5

- 1) протезирование, покрытие гипоплазированных зубов фарфоровыми коронками
- 2) протезирование гипоплазированных зубов пластмассовыми коронками
- 3) косметическое пломбирование композиционными материалами
- 4) косметическое пломбирование иономерными цементами
- 5) метод выбирается индивидуально

24. Оптимальная концентрация фтора в питьевой воде (в умеренных широтах) по гостандарту

Номер правильного ответа: 3

- 1) 0.3-0.8 мг/л
- 2) 0.5-0.9 мг/л
- 3) 1.0-1.2 мг/л
- 4) 2.0-3.0 мг/л
- 5) свыше 6.0 мг/л

25. Стандарты и порядки оказания медицинской помощи гражданам РФ устанавливаются на уровне:

Номер правильного ответа: 3

- 1) лечебно-профилактического учреждения
- 2) региональном
- 3) федеральном

26. Обследование пациента начинают с применения методов:

Номер правильного ответа: 4

- 1) рентгенологических
- 2) лабораторных
- 3) термометрических
- 4) основных
- 5) цитологических

27. Опрос пациента начинается с выяснения:

Номер правильного ответа: 4

- 1) истории жизни
- 2) анамнеза заболевания
- 3) перенесенных заболеваний
- 4) жалоб
- 5) аллергоанамнеза

28. При обследовании лимфатических узлов применяют метод:

Номер правильного ответа: 3

- 1) перкуссии
- 2) зондирования
- 3) пальпации
- 4) рентгенографии
- 5) аускультации

29. Подвижность зубов определяют с помощью инструмента:

Номер правильного ответа: 3

- 1) зеркала
- 2) углового зонда
- 3) пинцета
- 4) экскаватора
- 5) шпателя

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

30. Подбородочный нерв блокируется при анестезии:

Номер правильного ответа: 1

- 1) мандибулярной и ментальной
- 2) резцовой и инфраорбитальной
- 3) резцовой и туберальной
- 4) туберальной и палатинальной
- 5) инфраорбитальной и палатинальной

31. Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии:

Номер правильного ответа: 1

- 1) торусальной
- 2) туберальной
- 3) ментальной
- 4) инфраорбитальной
- 5) палатинальной

32. Вазоконстрикторы вызывают:

Номер правильного ответа: 2

- 1) расширение сосудов
- 2) сужение сосудов
- 3) гиперемия кожных покровов
- 4) парестезии
- 5) анальгезию

33. Общим осложнением при обезболивании является:

Номер правильного ответа: 3

- 1) кровотечение
- 2) контрактура
- 3) обморок
- 4) некроз
- 5) гематома

34. При общем обезболивании происходит:

Номер правильного ответа: 1

- 1) обратимое торможение ЦНС
- 2) необратимое торможение ЦНС
- 3) блокада периферических нервных рецепторов
- 4) блокада основного нервного ствола
- 5) возбуждение ЦНС

35. В зону обезболивания верхней челюсти при инфраорбитальной анестезии входят:

Номер правильного ответа: 4

- 1) моляры
- 2) верхняя губа, крыло носа
- 3) 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, слизистая оболочка альвеолярного отростка с небной стороны
- 4) 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, слизистая оболочка альвеолярного отростка с вестибулярной стороны
- 5) слизистая оболочка неба

36. Анафилактический шок преимущественно развивается на фоне:

Номер правильного ответа: 4

- 1) диатеза
- 2) интоксикации
- 3) хронического панкреатита
- 4) перенесенной ранее аллергической реакции
- 5) атеросклероза

37. Непосредственным общим осложнением местной анестезии является:

Номер правильного ответа: 1

- 1) обморок

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

- 2) гематома
- 3) контрактура
- 4) кровотечение
- 5) пародонтит

38. Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах:

Номер правильного ответа: 2

- 1) интубационная
- 2) проводниковая
- 3) эпидуральная
- 4) внутривенная
- 5) масочная

39. При удалении премоляров верхней челюсти применяют местную анестезию:

Номер правильного ответа: 1

- 1) инфильтрационную
- 2) торусальную
- 3) резцовую
- 4) мандибулярную
- 5) ментальную

40. При удалении моляров верхней челюсти применяют местную анестезию:

Номер правильного ответа: 3

- 1) торусальную
- 2) инфраорбитальную
- 3) туберальную
- 4) ментальную
- 5) резцовую

41. При удалении моляров нижней челюсти применяется анестезия:

Номер правильного ответа: 4

- 1) инфильтрационная
- 2) туберальная
- 3) ментальная
- 4) по Гоу-Гейтсу
- 5) палатинальная

42. Подъязычный нерв иннервирует:

Номер правильного ответа: 3

- 1) зубы верхней челюсти
- 2) слизистую оболочку неба
- 3) слизистую оболочку десны с язычной стороны
- 4) нижнюю губу и кожу подбородочной области
- 5) слизистую щеки

43. Скулоальвеолярный гребень расположен на уровне:

Номер правильного ответа: 2

- 1) второго моляра
- 2) первого моляра
- 3) второго премоляра
- 4) первого премоляра
- 5) клыка

44. Туберальная анестезия блокирует ветви:

Номер правильного ответа: 3

- 1) передние верхние альвеолярные
- 2) средние верхние альвеолярные
- 3) задние верхние альвеолярные
- 4) глазничного нерва
- 5) носонебного нерва

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

45. Верхняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва:

Номер правильного ответа: 2

- 1) I
- 2) II
- 3) III
- 4) IV
- 5) V

46. Нижняя челюсть иннервируется ветвью тройничного нерва:

Номер правильного ответа: 3

- 1) I
- 2) II
- 3) III
- 4) IV
- 5) V

47. Направление иглы при проведении туберальной анестезии:

Номер правильного ответа: 1

- 1) кверху, кзади, кнутри
- 2) кверху, кзади, кнаружи
- 3) книзу, кзади, кнутри
- 4) книзу, кзади, кнаружи
- 5) кверху, вперед, кнутри

48. Направление иглы при блокаде носо-небного нерва:

Номер правильного ответа: 2

- 1) кверху, кнутри
- 2) кверху, кзади
- 3) книзу, кнутри
- 4) книзу, кзади
- 5) книзу, кнаружи

49. Нижний луночковый нерв иннервирует:

Номер правильного ответа: 2

- 1) зубы верхней челюсти
- 2) зубы нижней челюсти
- 3) подъязычную область
- 4) 2/3 языка
- 5) слизистую щеки

50. Задние верхние альвеолярные нервы исключаются анестезией:

Номер правильного ответа: 4

- 1) мандибулярной
- 2) ментальной
- 3) инфраорбитальной
- 4) туберальной
- 5) торусапной

51. Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва:

Номер правильного ответа: 4

- 1) кожа и слизистая щеки
- 2) альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти
- 3) альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 4) бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 5) слизистая неба

52. Блокада двигательных волокон нижнечелюстного нерва осуществляется по:

Номер правильного ответа: 3

- 1) Берше-Дубову

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

- 2) Вайсбрему
- 3) Берше и Егорову
- 4) Вайсблату
- 5) Гоу-Гейтсу

53. Местным осложнением при обезболивании является:

Номер правильного ответа: 2

- 1) обморок
- 2) контрактура нижней челюсти
- 3) анафилактический шок
- 4) коллапс
- 5) отек Квинке

54. Зона иннервации носо-небного нерва:

Номер правильного ответа: 2

- 1) слизистая оболочка с вестибулярной стороны в области резцов
- 2) слизистая оболочка, твердое небо у резцов, до клыков
- 3) зубы верхней челюсти от клыка до клыка
- 4) альвеолярный отросток верхней челюсти
- 5) слизистая оболочка щеки

55. Инфраорбитальная анестезия проводится у отверстия:

Номер правильного ответа: 3

- 1) большого небного
- 2) резцового
- 3) подглазничного
- 4) нижнечелюстного
- 5) ментального

56. Депо анестетика при мандибулярной анестезии создают у отверстия:

Номер правильного ответа: 4

- 1) большого небного
- 2) резцового
- 3) подглазничного
- 4) нижнечелюстного
- 5) подбородочного

57. Для удаления зубов применяются инструменты:

Номер правильного ответа: 3

- 1) зеркало, пинцет
- 2) пинцет, зонд
- 3) элеватор, щипцы
- 4) шпатель, пинцет
- 5) зеркало, зонд

58. Для удаления фронтальной группы зубов верхней челюсти применяются щипцы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прямые со сходящимися щечками
- 2) прямые с несходящимися щечками
- 3) S-образные с несходящимися щечками
- 4) клювовидные с несходящимися щечками
- 5) байонетные

59. Перед операцией удаления зуба щипцами хирург проводит манипуляцию:

Номер правильного ответа: 3

- 1) люксацию
- 2) фиксацию
- 3) сепарацию
- 4) тракцию
- 5) пальпацию

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

60. Для удаления нижних премоляров используют щипцы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) клювовидные с шипами
- 2) клювовидные без шипов
- 3) S-образные
- 4) прямые
- 5) байонетные (специальные)

61. Для удаления верхних резцов и клыков используют щипцы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) клювовидные без шипов
- 2) прямые
- 3) S-образные
- 4) штыковидные
- 5) клювовидные с шипами

62. Для удаления верхних премоляров используют щипцы:

Номер правильного ответа: 3

- 1) прямые
- 2) S-образные с шипом
- 3) S-образные без шипа
- 4) клювовидные
- 5) байонетные

63. Для удаления третьих верхних моляров используют инструменты:

Номер правильного ответа: 4

- 1) штыковидный элеватор
- 2) клювовидные щипцы без шипов
- 3) угловые элеваторы
- 4) специальные щипцы
- 5) клювовидные щипцы с шипами

64. Для удаления третьих нижних моляров используют инструменты:

Номер правильного ответа: 2

- 1) штыковидный зонд
- 2) щипцы, изогнутые по плоскости
- 3) S-образные щипцы без шипа
- 4) прямые щипцы
- 5) S-образные щипцы с шипом

65. Заключительным этапом при удалении корней зубов является:

Номер правильного ответа: 4

- 1) ротация
- 2) тракция
- 3) сепарация
- 4) кюретаж
- 5) люксация

66. При удалении зубов с сохраненной коронкой применяются:

Номер правильного ответа: 2

- 1) щипцы со сходящимися щечками
- 2) щипцы с несходящимися щечками
- 3) элеваторы прямые
- 4) элеваторы угловые
- 5) гладилки

67. В области дна верхнечелюстной пазухи близко располагаются корни зубов:

Номер правильного ответа: 3

- 1) резцов и клыков

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

- 2) клыков и премоляров
- 3) премоляров и моляров
- 4) моляров и резцов
- 5) премоляров и резцов

68. Для удаления корней верхних премоляров предназначены щипцы с щечками:

Номер правильного ответа: 3

- 1) прямые с несходящимися
- 2) S-образные с несходящимися
- 3) S-образные со сходящимися
- 4) клювовидные со сходящимися
- 5) клювовидные с несходящимися

69. Для удаления корней нижних зубов предназначены щипцы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) клювовидные с шипами
- 2) клювовидные со сходящимися щечками
- 3) изогнутые по плоскости с шипами
- 4) S-образные со сходящимися щечками
- 5) байонетные

70. Прием ротации производят при удалении:

Номер правильного ответа: 4

- 1) моляров нижней челюсти
- 2) премоляров верхней челюсти
- 3) моляров верхней челюсти
- 4) резцов верхней челюсти
- 5) резцов нижней челюсти

71. Показанием к срочному удалению зуба является:

Номер правильного ответа: 4

- 1) дистопированные зубы
- 2) хронический пульпит
- 3) разрушение коронки зуба
- 4) некупируемое гнойное воспаление в периодонте
- 5) подвижность зуба 3 степени

72. Показанием к плановому удалению зуба является:

Номер правильного ответа: 3

- 1) острый остеомиелит
- 2) острый периостит
- 3) подвижность зуба 3 степени
- 4) хронический пульпит
- 5) острый пульпит

73. Основной вид обезболивания, применяемый при операции удаления зуба:

Номер правильного ответа: 1

- 1) местное
- 2) общее (наркоз)
- 3) комбинированное
- 4) нейролептанальгезия
- 5) акупунктура

74. В зону обезболивания при туберальной анестезии входят:

Номер правильного ответа: 1

- 1) 1.8,1-7,1.6,2.6,2.7,2.8
- 2) 1.8,2.8
- 3) 1.5, 1.4,2.4,2.5
- 4) 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
- 5) 17, 16,26,27

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

75. При анестезии у большого небного отверстия наступает блокада:

Номер правильного ответа: 2

- 1) носонебного нерва
- 2) большого небного нерва
- 3) среднего верхнего зубного сплетения
- 4) лицевые нервы
- 5) I ветви тройничного нерва

76. Обморок - это:

Номер правильного ответа: 3

- 1) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
- 2) аллергическая реакция на антиген
- 3) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
- 4) гипертонус мышц
- 5) дыхательная недостаточность

77. Коллапс - это:

Номер правильного ответа: 3

- 1) аллергическая реакция на антиген
- 2) потеря сознания с отсутствием мышечного тонуса
- 3) проявление сосудистой недостаточности с сохранением сознания
- 4) гипертонус мышц
- 5) дыхательная недостаточность

78. Показанием к удалению зуба является:

Номер правильного ответа: 4

- 1) острый пульпит
- 2) глубокий кариес
- 3) острый периодонтит
- 4) хронический гранулематозный периодонтит
- 5) паротит

79. Осложнения, возникающие во время операции удаления зуба:

Номер правильного ответа: 5

- 1) верхнечелюстной синусит
- 2) периостит
- 3) альвеолит
- 4) остеомиелит
- 5) перелом коронки или корня удаляемого зуба

80. Осложнения, возникающие непосредственно после операции удаления зуба:

Номер правильного ответа: 2

- 1) паротит
- 2) кровотечение
- 3) невралгия тройничного нерва
- 4) артрит височно-нижнечелюстного сустава
- 5) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

81. Возможное осложнение во время операции удаления зубов верхней челюсти:

Номер правильного ответа: 3

- 1) паротит
- 2) невралгия тройничного нерва
- 3) перфорация дна верхнечелюстной пазухи
- 4) артрит височно-нижнечелюстного сустава
- 5) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

82. Возможное осложнение во время операции удаления моляров верхней челюсти:

Номер правильного ответа: 2

- 1) паротит

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

- 2) отлом бугра верхней челюсти
- 3) невралгия тройничного нерва
- 4) анкилоз височно-нижнечелюстного сустава
- 5) артрит височно-нижнечелюстного сустава

83. Возможное осложнение во время операции удаления 3-го моляра нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 5

- 1) синусит
- 2) периостит
- 3) альвеолит
- 4) остеомиелит
- 5) перелом нижней челюсти

84. К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят:

Номер правильного ответа: 5

- 1) анурез
- 2) синусит
- 3) альвеолит
- 4) остеомиелит
- 5) гипертонический криз

85. К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят:

Номер правильного ответа: 5

- 1) анурез
- 2) синусит
- 3) альвеолит
- 4) остеомиелит
- 5) анафилактический шок

86. К общесоматическим осложнениям во время операции удаления зуба относят:

Номер правильного ответа: 3

- 1) анурез
- 2) синусит
- 3) обморок
- 4) альвеолит
- 5) остеомиелит

87. К отдаленным местным осложнениям, возникающим после операции удаления зуба, относят:

Номер правильного ответа: 5

- 1) анурез
- 2) миозит
- 3) коллапс
- 4) невралгию
- 5) остеомиелит

88. К отдаленным осложнениям местного характера после операции удаления зуба верхней челюсти относят:

Номер правильного ответа: 5

- 1) анурез
- 2) миозит
- 3) коллапс
- 4) невралгия
- 5) oro-антральное сообщение

89. При обследовании лимфатических узлов применяют метод:

Номер правильного ответа: 3

- 1) перкуссии
- 2) зондирования
- 3) пальпации
- 4) рентгенографии

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

5) аускультации

90. Для диагностики состояния тканей пародонта используют:

Номер правильного ответа: 1

- 1) индекс CRITN
- 2) индекс Грин-Вермиллиона
- 3) индекс РНР
- 4) витальное окрашивание эмали
- 5) перкуссию зубов

91. В случае, если у Вас на приеме возник анафилактический шок, перечислите обязательные манипуляции:

Номер правильного ответа: 1;2

- 1) Ввести адреналин
- 2) Вызвать неотложную помощь для госпитализации пациента в стационар
- 3) Дать под язык нитроглицерин
- 4) Внутривенно ввести гидроксипрохлорид
- 5) Внутривенно ввести кальция хлорида 10%

92. Пациентам группы риска показано использование местноанестезирующего средства не влияющего на тонус сосуда

Номер правильного ответа: 1

- 1) Мепивакаин
- 2) Новокаин
- 3) Лидокаин
- 4) Артикаин
- 5) Анесетезин

93. Кандидоз развивается на фоне длительного приёма

Номер правильного ответа: 1

- 1) цитостатиков
- 2) кератопластиков
- 3) поливитаминов
- 4) ферментов
- 5) тромболитиков

94. Ирригация корневых каналов проводится растворами

Номер правильного ответа: 1

- 1) гипохлорита натрия
- 2) дистиллированной водой
- 3) Физиологическим
- 4) Спиртом
- 5) Крезофеном

95. Наличие пародонтального кармана является характерным признаком:

Номер правильного ответа: 3

- 1) катарального гингивита
- 2) язвенно-некротического гингивита
- 3) пародонтита
- 4) пародонтоза
- 5) пародонтомы

96. Наличие ложного десневого кармана характерно для:

Номер правильного ответа: 3

- 1) катарального гингивита
- 2) язвенно-некротического гингивита
- 3) гипертрофического гингивита
- 4) хронического пародонтита
- 5) хронического пародонтита в стадии обострения

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

97. Фактор, способствующий развитию локального хронического гингивита:

Номер правильного ответа: 2

- 1) заболевания желудочно-кишечного тракта
- 2) скученность зубов
- 3) заболевания крови
- 4) гиповитаминоз С
- 5) низкое содержание фтора в питьевой воде

98. Причиной генерализованного пародонтита может быть:

Номер правильного ответа: 3

- 1) отсутствие контактного пункта между соседними зубами
- 2) нависающий край пломбы
- 3) эндокринные заболевания
- 4) скученность зубов
- 5) нарушение техники чистки зубов

99. Что происходит с гуттаперчевым штифтом, выведенным за апекс:

Номер правильного ответа: 1

- 1) покрывается фиброзной капсулой
- 2) вызывает гранулему инородного тела

100. Какую патологию может поддерживать повышенный уровень холестерина в крови:

Номер правильного ответа: 2

- 1) облитерацию канала из-за дегенерации сосудов пульпы и неинфекционные пульпиты
- 2) развитие гранулемы инородного тела из-за скопления кристаллов холестерина в участках воспаления периодонта и незаживающие периодонтиты

101. При проведении апикальной хирургии обязательным условием будет являться:

Номер правильного ответа: 3

- 1) укрепление канала зуба внутриканальным штифтом/вкладкой
- 2) пломбирование канала с выведением твердеющего пломбировочного материала за верхушку корня зуба
- 3) повторное эндодонтическое лечение и наблюдение минимум в течение 6 мес.

102. В ближайшие месяцы после качественной эндодонтии деструктивные процессы в очаге воспаления могут:

Номер правильного ответа: 1

- 1) расти из-за активности макрофагов
- 2) не изменяться из-за активности макрофагов
- 3) уменьшаться из-за активности макрофагов

103. Какое решение надо принять, если при плановой замене коронарной реставрации в устье канала клинически и рентгенологически бессимптомного зуба была обнаружена «чернота»:

Номер правильного ответа: 4

- 1) провести качественную временную реставрацию и взять зуб под наблюдение в течение 6 месяцев
- 2) провести качественную постоянную реставрацию
- 3) повторить эндодонтическое лечение, провести качественную временную реставрацию и взять зуб под наблюдение в течение 6 месяцев
- 4) повторить эндодонтическое лечение и провести качественную постоянную реставрацию

104. Особенность сердечно легочной реанимации у беременных

Номер правильного ответа: 2

- 1) Нет особенностей
- 2) Валик под правый бок – сдвинуть матку влево (освободить нижнюю полую вену), при проведении компрессий грудной клетки давить выше середины грудины
- 3) Не проводить никаких мероприятий до приезда БСМП
- 4) Прежде чем проводить СЛР, провести ингаляцию кислорода

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

105. Показана ли у беременных фибрилляция с помощью автоматического дефибрилятора или ее должен проводить врач скорой помощи только профессиональным аппаратом

Номер правильного ответа: 1

- 1) Да
- 2) Нет
- 3) Да, но проводить её должен только врач БСМП
- 4) Да, проводить ее можно только с помощью выполнения компрессий грудной клетки и искусственных вдохов, не используя дефибрилятор

106. Клиническими признаками красного плоского лишая слизистой оболочки полости рта являются:

Номер правильного ответа: 1

- 1) мелкие, сферические, голубовато-перламутровые узелки, образующие сетку на невоспаленной или воспаленной слизистой оболочке щек и языка
- 2) отчетливо очерченная гиперемия с инфильтрацией, голубовато-перламутровым гиперкератозом и явлениями атрофии
- 3) очаги серо-белого цвета с частично снимающимся налетом на слегка гиперемизированном фоне с явлениями мацерации
- 4) резко очерченные, слегка возвышающиеся участки серо-белого цвета, окруженные узким венчиком гиперемии на фоне невоспаленной слизистой
- 5) резко очерченные участки слизистой оболочки серо-белого цвета, располагающиеся на неизменном фоне в передних отделах щек

107. Проба Шиллера - Писарева проводится с целью:

Номер правильного ответа: 2

- 1) определения гигиенического состояния зубов
- 2) выявления изъязвлений внутридесневых карманов
- 3) оценки степени воспалительных изменений десны
- 4) выявления зубной бляшки
- 5) определения гноя в десневом кармане

108. К гигиеническим относятся следующие индексы:

Номер правильного ответа: 3

- 1) ПИ, ПМА, СРІТN
- 2) Шиллера — Писарева
- 3) Федорова - Володкиной, Грина — Вермильона
- 4) ПИ
- 5) все перечисленные

109. Клиническими признаками катарального гингивита являются:

Номер правильного ответа: 3

- 1) кровоточивость десен
- 2) наличие зубного налета, кровоточивость десен
- 3) отек и гиперемия десневого края и межзубных десневых сосочков, кровоточивость десен, отсутствие десневого кармана
- 4) кровоточивость десен, гиперестезия шеек зубов
- 5) гиперестезия шеек зубов

110. Основными клиническими признаками отечной формы гипертрофического гингивита являются:

Номер правильного ответа: 1

- 1) десневые сосочки увеличены, имеют синюшный оттенок, глянцевидную поверхность, кровоточат при дотрагивании, при надавливании остаются отпечатки
- 2) десневые сосочки увеличены, плотные на ощупь, кровоточат при дотрагивании
- 3) десневые сосочки увеличены, отечны, гиперемизированы, кровоточат при надавливании, при зондировании определяются десневые карманы
- 4) кровоточивость при дотрагивании
- 5) наличие ложных десневых карманов

111. Начальный кариес характеризуется появлением:

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

Номер правильного ответа: 1

- 1) меловидного пятна на поверхности эмали
- 2) эрозии эмали
- 3) полости в пределах эмали
- 4) полости в пределах дентина
- 5) кровоточивости десен

112. Степень поражения эмали при очаговой деминерализации можно оценить с помощью:

Номер правильного ответа: 3

- 1) зондирования
- 2) электроодонтодиагностики
- 3) витального окрашивания эмали
- 4) рентгенологического исследования
- 5) определения индекса Грин-Вермиллиона

113. Для дифференциальной диагностики кариеса в стадии пятна и некариозных поражений твердых тканей зубов проводят:

Номер правильного ответа: 2

- 1) определение гигиенических индексов
- 2) витальное окрашивание эмали раствором метиленового синего
- 3) электроодонтодиагностику
- 4) рентгенологическое исследование
- 5) микробиологическое исследование

114. Процессы ионного обмена, минерализации, реминерализации обеспечивает свойство эмали:

Номер правильного ответа: 4

- 1) микротвердость
- 2) плотность
- 3) растворимость
- 4) проницаемость
- 5) резистентность

115. Наиболее частой причиной возникновения очаговой деминерализации эмали является:

Номер правильного ответа: 4

- 1) наследственность
- 2) инфекционные заболевания ребенка на первом году жизни
- 3) высокое содержание фторида в питьевой воде
- 4) неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта
- 5) использование высокоабразивных средств гигиены полости рта

116. К некариозным поражениям, возникающим до прорезывания зубов, относятся:

Номер правильного ответа: 3

- 1) кислотный некроз
- 2) клиновидный дефект
- 3) флюороз
- 4) эрозия эмали
- 5) очаговая деминерализация эмали

117. Для катарального гингивита характерно:

Номер правильного ответа: 1

- 1) кровоточивость десен
- 2) наличие пародонтальных карманов
- 3) ретракция десны
- 4) гипертрофия десны
- 5) атрофия альвеолы

118. Для уменьшения кровоточивости десен наиболее целесообразно использовать зубные пасты:

Номер правильного ответа: 3

- 1) фторидсодержащие
- 2) кальцийсодержащие

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

- 3) с растительными добавками
- 4) гигиенические
- 5) отбеливающие

119. Основным методом профилактики катарального гингивита является:

Номер правильного ответа: 1

- 1) рациональная гигиена полости рта
- 2) сбалансированное питание
- 3) полоскание полости рта растворами фторидов
- 4) санация полости рта
- 5) избирательное шлифование зубов

120. Пациентам с воспалительными заболеваниями пародонта в стадии обострения рекомендуют пользоваться зубной щеткой:

Номер правильного ответа: 1

- 1) мягкой
- 2) средней жесткости
- 3) жесткой
- 4) очень жесткой
- 5) чистка зубов не требуется

121. Эффективные способы извлечения гуттаперчи на пластиковом носителе:

Номер правильного ответа: 5

- 1) при удалении пломбы постараться не срезать части носителя, которые находятся за пределами устьев, уцепиться за них щипцами и постараться вытянуть
- 2) залить полость зуба органическим растворителем на 20 секунд, К-файлом 10-15 размера длиной 21 мм пройти на несколько мм вглубь между дентином и пластиковым носителем, вращая файл на $\frac{3}{4}$ оборота по и против часовой стрелке, повторить процедуру с двух сторон от носителя, в сформированные углубления («дорожки») ввести два-три инструмента Hedstroem 20 размера длиной 21 мм и сплести их в «косичку» и не тянуть, а опираясь на соседний зуб, рычаговым движением пытаться извлечь «косичку» с носителем, для усиления эффекта касаясь файлов, заплетенных в «косичку» ультразвуком с помощью ассистента
- 3) Profile 25.06 на скорости вращения от 550 до 1500 об/мин ввести между носителем и стенкой корневого канала, ослабляя связь гуттаперчи с носителем, после извлечения носителя остатки гуттаперчи убрать Hedstroem
- 4) ультразвуковой насадкой касаться пластикового носителя до извлечения его из канала полностью или частями, после извлечения носителя остатки гуттаперчи убрать Hedstroem
- 5) всеми способами в перечисленной последовательности

122. При перелечивании многоканального зуба с какого канала лучше начинать лечение:

Номер правильного ответа: 1

- 1) с того, в котором больше проблем
- 2) с того, в котором меньше проблем
- 3) работать одновременно во всех каналах

123. Тактика начала перелечивания резорцинных зубов:

Номер правильного ответа: 1

- 1) создать полость доступа, ультразвуком наметить устья, залить р-ром гипохлорита натрия на 2 минуты, начать работать стальным К-файлом 06.02 размера длиной 21 мм, формирую «ковровую» дорожку
- 2) создать полость доступа, ультразвуком наметить устья, залить р-ром «Эндосольф-Г» на 2 минуты, начать работать стальным К-файлом 06.02 размера длиной 21 мм, формирую «ковровую» дорожку

124. Ятрогенные заболевания являются:

Номер правильного ответа: 4

- 1) частным случаем психогений
- 2) нежелательными изменениями психики, порожденными врачом
- 3) расстройствами психики в результате воздействия «слова» врача
- 4) все выше перечисленное верно

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

125. В какой период стоматологического вмешательства чаще всего возникают осложнения соматического характера:

Номер правильного ответа: 3

- 1) Во время проведения диагностики
- 2) Во время лечения
- 3) Во время проведения инъекции
- 4) Через несколько дней после лечения

126. Что такое официальная форма анестетика:

Номер правильного ответа: 2

- 1) Анестетик, подготовленный *ex tempore*
- 2) Готовая форма препарата, включённая в гос. реестр лекарственных средств
- 3) Раствор
- 4) Суспензия

127. Какие официальные анестетики есть в России для применения в стоматологии:

Номер правильного ответа: 4

- 1) Лидокаин
- 2) УльтракаинTM
- 3) УльтракаинTM, УбистезинTM, СкандонестTM, Лидокаин
- 4) Артикаин, мепивакаин

128. Какими объективными диагностическими тестами (приборами) имеющимися у нас в клинике можно быстро определить и оценить состояние пациента:

Номер правильного ответа: 3

- 1) Аппарат для измерения АД
- 2) Аппарат для измерения АД, термометр
- 3) Аппарат для измерения АД, термометр, глюкометр, коагулометр
- 4) Аппарат для измерения АД, глюкометр

129. Укажите нормальные показатели глюкозы крови:

Номер правильного ответа: 2

- 1) 7 ммоль/л
- 2) 3,3 - 5,5 ммоль/л
- 3) 6,6 ммоль/л
- 4) 12 ммоль/л

130. Вид местной анестезии, используемой при стоматологических вмешательствах:

Номер правильного ответа: 2

- 1) интубационная
- 2) проводниковая
- 3) эпидуральная
- 4) внутривенная
- 5) масочная

131. Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта:

Номер правильного ответа: 3

- 1) подкожная
- 2) интубационная
- 3) интралигаментарная
- 4) эпидуральная
- 5) внутривенная

132. Клинические ситуации, указывающие на необходимость общего обезболивания:

Номер правильного ответа: 1

- 1) аллергические реакции на анестетики
- 2) множественный кариес зубов
- 3) высокая температура
- 4) подвижность зубов

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

5) повышенное АД

133. Из полости черепа нижнечелюстной нерв выходит через:

Номер правильного ответа: 1

- 1) овальное отверстие
- 2) круглое отверстие
- 3) подглазничное отверстие
- 4) верхнеглазничную щель
- 5) нижнечелюстной канал

134. Причиной возникновения системной гипоплазии постоянных зубов является

Номер правильного ответа: 1

- 1) заболевания ребенка на первом году жизни
- 2) наследственность
- 3) заболевания матери во время беременности
- 4) средний кариес зубов у матери в период беременности
- 5) высокое содержание фторида в питьевой воде

135. При потере пациентом сознания пульс определяют над проекцией

Номер правильного ответа: 5

- 1) Лучевой артерии
- 2) Локтевой артерии
- 3) Плечевой артерии
- 4) Общей сонной артерии
- 5) Наружной сонной артерии

136. Электровозбудимость пульпы при воспалении

Номер правильного ответа: 3

- 1) Возрастает
- 2) Остается без изменений
- 3) Снижается
- 4) Колеблется
- 5) Не определяется

137. Тоннельный способ препарирования кариозной полости II класса позволяет

Номер правильного ответа: 1

- 1) сохранить существующий естественный контактный пункт
- 2) формировать контактный пункт
- 3) сохранить жевательную поверхность
- 4) сохранить биологию пульпы
- 5) сохранить контактную поверхность соседнего зуба

138. При отверждении химического композита полимеризационная усадка происходит в направлении

Номер правильного ответа: 1

- 1) Центра
- 2) протравленной эмали
- 3) источника света
- 4) периферии
- 5) дна кариозной полости

139. Наиболее частый путь инфицирования пульпы

Номер правильного ответа: 1

- 1) по дентинным канальцам из кариозной полости
- 2) по артериолам (гематогенное инфицирование)
- 3) через одно из верхушечных отверстий при наличии пародонтального кармана
- 4) по лимфатическим сосудам
- 5) травматические повреждения пульпы

140. В определение общественного здоровья, принятое в ВОЗ, входят элементы

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

Номер правильного ответа: 1

- 1) физическое, социальное и психологическое благополучие
- 2) возможность трудовой деятельности
- 3) наличие или отсутствие болезней
- 4) наличие благоустроенного жилища
- 5) полноценное питание

141. В базовую программу обязательного медицинского страхования входят

Номер правильного ответа: 1

- 1) перечень видов и объемов медицинских услуг, осуществляемых за счет средств ОМС
- 2) стоимость различных видов медицинской помощи
- 3) организация добровольного медицинского страхования
- 4) виды платных медицинских услуг
- 5) дифференциация подушевой стоимости медицинской помощи в зависимости от пола и возраста.

142. Основанием допуска к медицинской (фармацевтической) деятельности являются документы

Номер правильного ответа: 2

- 1) диплом об окончании высшего или среднего медицинского (фармацевтического) заведения
- 2) сертификат
- 3) лицензия
- 4) свидетельство об окончании курсов
- 5) запись в трудовой книжке

143. Основную ответственность за клинический диагноз несет

Номер правильного ответа: 4

- 1) зубной техник
- 2) помощник стоматолога (сестра)
- 3) помощник стоматолога, получивший сертификат
- 4) врач-стоматолог
- 5) главный врач стоматологической поликлиники

144. Избавляет от возможных необоснованных обвинений в адрес врача после проведенного не совсем удачного лечения

Номер правильного ответа: 5

- 1) только тщательная запись выполненных манипуляций
- 2) запись предписаний
- 3) сниженный преискурант
- 4) запись обращений к специалистам
- 5) запись полного анамнеза и тщательная запись выполненных манипуляций

145. Очистку, обработку и стерилизацию стоматологических наконечников следует проводить

Номер правильного ответа: 5

- 1) обязательная стерилизация
- 2) достаточно дезинфекции
- 3) необходима предстерилизационная подготовка с последующей дезинфекцией
- 4) обязательна дезинфекция и стерилизация
- 5) стерилизация с предварительной предстерилизационной подготовкой

146. Формируя диспансерные группы у стоматолога необходимо учитывать: 1. форму активности кариеса; 2. уровень соматического и стоматологического здоровья; 3. факторы риска возникновения заболеваний; 4. факторы риска утяжеления патологии; 5. уровень стоматологического здоровья. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 5

- 1) если правильны ответы 1, 2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5

147. Общественное здоровье характеризуют показатели

Тесты на аттестацию. Стоматология общей практики. Высшая категория.

Номер правильного ответа: 1

- 1) трудовая активность населения
- 2) заболеваемость
- 3) инвалидность
- 4) демографические показатели
- 5) физическое развитие населения

148. Основными задачами поликлиники являются

Номер правильного ответа: 3

- 1) медицинская помощь больным на дому
- 2) лечебно-диагностическое обслуживание населения
- 3) организация работы по пропаганде здорового образа жизни
- 4) профилактическая работа
- 5) экспертиза временной нетрудоспособности

149. Организация мер по сокращению затраты времени пациентов на посещение поликлиники включает

Номер правильного ответа: 2

- 1) анализ интенсивности потока больных по времени
- 2) нормирование деятельности врачей
- 3) правильную организацию графика приема врачей
- 4) четкую работу регистратуры
- 5) дисциплину персонала

150. В базовую программу обязательного медицинского страхования входят

Номер правильного ответа: 3

- 1) перечень видов и объемов медицинских услуг, осуществляемых за счет средств ОМС
- 2) стоимость различных видов медицинской помощи
- 3) организация добровольного медицинского страхования
- 4) виды платных медицинских услуг
- 5) дифференциация подушевой стоимости медицинской помощи в зависимости от пола и возраста