

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

1. Метод Коркхауза основан на

Номер правильного ответа: 1

- 1) зависимости суммы мезиодистальных размеров верхних резцов и длины переднего отрезка зубного ряда
- 2) зависимости ширины и длины зубных рядов
- 3) пропорциональности размеров верхних и нижних резцов
- 4) зависимости суммы мезиодистальных размеров нижних резцов и ширины зубных рядов

2. Вестибулярная пластинка Хинца относится к аппаратам

Номер правильного ответа: 2

- 1) комбинированного действия
- 2) функционального действия
- 3) механического действия

3. Аппарат Брюкля применяется для лечения

Номер правильного ответа: 4

- 1) ретрузии нижних фронтальных зубов
- 2) скученности зубов
- 3) протрузии верхних фронтальных зубов
- 4) обратного резцового перекрытия

4. Аппарат Наас применяется для

Номер правильного ответа: 3

- 1) дистализации моляров
- 2) лечения открытого прикуса
- 3) расширения верхнего зубного ряда
- 4) лечения глубокого прикуса

5. Глубина резцового перекрытия считается нормальной

Номер правильного ответа: 1

- 1) на 1/3 нижних
- 2) на 2/3 нижних
- 3) более, чем 2/3 нижних
- 4) краевое смыкание

6. Лицевая дуга относится к аппаратам

Номер правильного ответа: 1

- 1) механического действия
- 2) функционального действия
- 3) комбинированного действия
- 4) ретенционным

7. Какое направление сил используется для поворота зуба по оси

Номер правильного ответа: 2

- 1) две силы в одном направлении
- 2) две силы в противоположном направлении
- 3) одна сила перпендикулярно оси зуба
- 4) одна сила вдоль оси зуба

8. Назовите ситуацию, при которой выражена губо-подбородочной складка

Номер правильного ответа: 3

- 1) асимметрия лица
- 2) увеличение нижней трети лица
- 3) уменьшение нижней трети лица
- 4) открытый прикус

9. При какой патологии прикуса нижняя губа перекрывает верхнюю

Номер правильного ответа: 4

- 1) дистальный прикус
- 2) перекрестный прикус

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

- 3) открытый прикус
- 4) мезиальный прикус

10. Укажите в каких клинических ситуациях не возможно измерить ширину зубной дуги методом Пона

Номер правильного ответа: 3;4

- 1) дистопия верхних клыков
- 2) дистопия нижних клыков
- 3) ретенция зуба 46
- 4) разрушение коронки зуба 26

11. Назовите точки, через которые проходит Франкфуртская горизонталь

Номер правильного ответа: 2

- 1) auriculare - gonion
- 2) porion-orbitale
- 3) subnazale - pogonion

12. Укажите значение угла SNB при нижнечелюстной ретрогнатии

Номер правильного ответа: 1

- 1) 70
- 2) 85
- 3) 90
- 4) 100

13. Перечислите клинические признаки аномалия прикуса II/2 по Энгля

Номер правильного ответа: 2;4

- 1) протрузия резцов верхней челюсти
- 2) ретрузия резцов верхней челюсти
- 3) увеличение высоты нижней трети лица
- 4) соотношение моляров по 2 классу

14. Укажите основные помещения зубо-технической лаборатории

Номер правильного ответа: 1;2;4

- 1) гипсовочная
- 2) литейная
- 3) гардероб
- 4) паяльно-сварочная

15. Укажите факторы способствующие развитию диастемы

Номер правильного ответа: 1;2;3;4

- 1) микроденция зубов
- 2) мезиоденс
- 3) низкое прикрепление уздечки верхней губы
- 4) адентия боковых резцов

16. Укажите методы создания места в зубной дуге при аномалиях I класса по Энгля

Номер правильного ответа: 2;3

- 1) удаление зубов на верхней челюсти
- 2) расширение
- 3) апроксимальное шлифование
- 4) удаление зубов на нижней челюсти

17. Перечислите признаки нарушения процесса прорезывания

Номер правильного ответа: 1;3;4

- 1) ретенция зуба
- 2) тесное положение зубов
- 3) раннее прорезывание
- 4) позднее прорезывание

18. Дайте определение транспозиции зубов

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

Номер правильного ответа: 4

- 1) дистальное перемещение
- 2) мезиальное положение
- 3) супраположение
- 4) соседние зубы меняются местами в зубной дуге

19. Причины нарушения носового дыхания у детей

Номер правильного ответа: 3;4

- 1) сосание соски
- 2) искусственное вскармливание
- 3) аденоиды
- 4) аллергические риниты

20. Нормальная форма зубной дуги верхней челюсти в постоянном прикусе

Номер правильного ответа: 3

- 1) полукруг
- 2) полуэллипс
- 3) парабола
- 4) трапецевидная

21. Второе физиологическое повышение прикуса происходит с прорезыванием

Номер правильного ответа: 1

- 1) первого постоянного моляра
- 2) второй постоянный моляр
- 3) клык
- 4) постоянные резцы

22. На верхней челюсти альвеолярная дуга

Номер правильного ответа: 2;4

- 1) меньше апикальной
- 2) больше апикальной
- 3) больше зубной
- 4) меньше зубной

23. Какая техника наклеивания брекетов требует проведения лабораторного этапа:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прямая
- 2) непрямая
- 3) никакая не требует
- 4) обе требуют

24. Какая из нижеперечисленных аномалий зубов не является аномалией положения

Номер правильного ответа: 4

- 1) тортоаномалия
- 2) супраположение
- 3) инфраположение
- 4) ретенция

25. При рождении у ребенка отмечается следующее соотношение челюстей

Номер правильного ответа: 2

- 1) прогнатическое
- 2) ретрогеническое
- 3) прямое
- 4) прогеническое

26. Функциональное состояние мышц челюстно-лицевой области определяют методом

Номер правильного ответа: 1

- 1) электромиографии
- 2) реопародонтографии
- 3) аксиографии

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

4) томографии

27. При «инфантильном» типе глотания у детей формируется

Номер правильного ответа: 3

- 1) глубокий прикус
- 2) перекрестный прикус
- 3) открытый прикус
- 4) дистальный

28. Какой точке на коронке зуба должна соответствовать срединная точка опорной площадки брекета в технике прямой дуги?

Номер правильного ответа: 3

- 1) точке пересечения вертикальной оси зуба с клинической шейкой;
- 2) точке пересечения вертикальной оси зуба с линией режущего края коронки;
- 3) в точке пересечения вертикальной оси зуба с горизонтальной линией, разделяющей коронку на две равные половины.

29. Для глубокого прикуса характерны следующие изменения зубных рядов

Номер правильного ответа: 2

- 1) зубоальвеолярное удлинение во фронтальном и боковых сегментах.
- 2) зубоальвеолярное удлинение во фронтальном, зубоальвеолярное укорочение в боковых сегментах.
- 3) зубоальвеолярное удлинение в боковых сегментах.
- 4) зубоальвеолярное укорочение во фронтальном, зубоальвеолярное удлинение в боковых сегментах.

30. Глубокая резцовая окклюзия – это аномалия окклюзии

Номер правильного ответа: 1

- 1) в вертикальной плоскости
- 2) в сагиттальной плоскости
- 3) в трансверзальной плоскости

31. При втором классе Энгля мезиально-щечный бугор первого моляра верхней челюсти находится

Номер правильного ответа: 3

- 1) в межбугровой фиссуре первого нижнего моляра
- 2) позади межбугровой фиссуры первого нижнего моляра
- 3) впереди от межбугровой фиссуры первого нижнего моляра
- 4) в межбугровой фиссуре второго нижнего моляра

32. В результате вредной привычки сосания большого пальца руки у ребенка формируется

Номер правильного ответа: 2

- 1) дистальная окклюзия с ретрузией верхних резцов
- 2) дистальная окклюзия с протрузией верхних резцов
- 3) дистальная окклюзия с протрузией нижних резцов
- 4) мезиальная окклюзия

33. Мезиальная окклюзия – это аномалия окклюзии

Номер правильного ответа: 2

- 1) в вертикальной плоскости
- 2) в сагиттальной плоскости
- 3) в трансверзальной плоскости

34. Дистальная окклюзия – это аномалия окклюзии

Номер правильного ответа: 2

- 1) в вертикальной плоскости
- 2) в сагиттальной плоскости
- 3) в трансверзальной плоскости

35. К причинам развития дистальной окклюзии можно отнести

Номер правильного ответа: 1;4

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

- 1) микрогнатию нижней челюсти
- 2) микрогнатию верхней челюсти
- 3) макрогнатию нижней челюсти
- 4) макрогнатию верхней челюсти

36. По классификации Энгля дистальный блокирующий прикус относится к

Номер правильного ответа: 3

- 1) I классу
- 2) II классу 1 подклассу
- 3) II классу 2 подклассу
- 4) III классу

37. На нижней челюсти самой широкой является

Номер правильного ответа: 2

- 1) альвеолярная дуга
- 2) базальная дуга
- 3) зубная дуга

38. На верхней челюсти самой широкой является

Номер правильного ответа: 3

- 1) альвеолярная дуга
- 2) базальная дуга
- 3) зубная дуга

39. К сагиттальным аномалиям окклюзии относится

Номер правильного ответа: 1;3

- 1) мезиальный прикус
- 2) глубокий прикус
- 3) дистальный прикус
- 4) открытый прикус

40. Для устранения вредной привычки сосания пальца применяют пластинку

Номер правильного ответа: 2

- 1) нёбную с вестибулярной дугой
- 2) вестибулярную пластинку
- 3) лицевую дугу
- 4) Квадхеликс

41. Аппарат Наас применяется для

Номер правильного ответа: 2

- 1) дистализации моляров верхнего зубного ряда
- 2) расширения верхнего зубного ряда
- 3) лечения открытого прикуса
- 4) лечения глубокого прикуса

42. Угол SNB на ТРГ определяет положение

Номер правильного ответа: 1

- 1) апикального базиса нижней челюсти в сагитальной плоскости относительно плоскости основания черепа.
- 2) апикального базиса верхней челюсти в сагитальной плоскости относительно плоскости основания черепа.
- 3) взаимное расположение апикальных базисов

43. Какая из нижеперечисленных аномалий не является аномалией окклюзии по трансверзали

Номер правильного ответа: 2

- 1) палатиноокклюзия
- 2) мезиоокклюзия
- 3) вестибулоокклюзия
- 4) лингвоокклюзия

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

44. Угол SNA на ТРГ определяет положение

Номер правильного ответа: 2

- 1) апикального базиса нижней челюсти в сагитальной плоскости относительно плоскости основания черепа
- 2) апикального базиса верхней челюсти в сагитальной плоскости относительно плоскости основания черепа.
- 3) взаимное расположение апикальных базисов

45. Под «стационарной опорой» следует понимать опору, когда

Номер правильного ответа: 1

- 1) опорные зубы не перемещаются
- 2) опорные и перемещаемые зубы двигаются навстречу с равной скоростью.

46. Дифференциальную диагностику зубоальвеолярных и гнатических форм прикуса

Номер правильного ответа: 2

- 1) клинического обследования пациентов
- 2) изучения боковых ТРГ головы
- 3) изучения диагностических моделей челюстей

47. Перекрестная окклюзия – это аномалия окклюзии:

Номер правильного ответа: 3

- 1) в вертикальной плоскости
- 2) в сагитальной плоскости
- 3) в трансверзальной плоскости

48. Рентгенографию кистей рук используют для

Номер правильного ответа: 1

- 1) для прогноза роста челюстей
- 2) для изучения динамики роста организма
- 3) для выяснения аномалий развития скелета
- 4) для диагностики аномалий прикуса

49. Какой из перечисленных аппаратов позволяет провести корпусное перемещение зуба:

Номер правильного ответа: 1

- 1) брекет-система
- 2) пластника с вестибулярной дугой
- 3) съемная пластинка с рукообразной пружиной.
- 4) трейнер

50. Какую ортодонтическую дугу используют на этапе закрытия промежутков механикой скольжения?

Номер правильного ответа: 1

- 1) стальную четырехгранную;
- 2) круглую нитиноловую;
- 3) мультифлекс.

51. Для глубокого прикуса типичен тип роста лицевого скелета

Номер правильного ответа: 2

- 1) горизонтальный
- 2) вертикальный
- 3) нейтральный

52. Электромиография регистрирует:

Номер правильного ответа: 2

- 1) движение ВНЧС
- 2) биопотенциалы мышц челюстно-лицевой области
- 3) Гемодинамику мышц челюстно-лицевой области

53. Под «минимальной опорой» следует понимать опору, когда

Номер правильного ответа: 3

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

- 1) опорные зубы не перемещаются;
- 2) опорные и перемещаемые зубы двигаются навстречу с равной скоростью.
- 3) опорные зубы двигаются быстрее, чем перемещаемые;

54. Перемещение анкилозированных зубов

Номер правильного ответа: 2

- 1) возможно
- 2) не возможно

55. Форма зубных дуг в молочном прикусе имеет форму

Номер правильного ответа: 3

- 1) параболы
- 2) полуэллипса
- 3) полукруга
- 4) верх - полуэллипс, низ - парабола

56. В норме фронтальные зубы ребенка в возрасте 5 лет располагаются

Номер правильного ответа: 1

- 1) с тремами
- 2) без трем

57. Ретенция зубов относится к аномалиям

Номер правильного ответа: 3

- 1) положения зубов
- 2) размеров зубов
- 3) сроков прорезывания

58. Анализ работы врача ортодонта целесообразно проводить с учетом количества

Номер правильного ответа: 2

- 1) посещений больных
- 2) вылеченных детей
- 3) примененных ортодонтических аппаратов
- 4) УЕТ

59. Работу воспитателей детских садов в связи с профилактикой аномалий прикуса следует включить

Номер правильного ответа: 4

- 1) борьбу с вредными привычками
- 2) правильную осанку
- 3) тренировку носового дыхания
- 4) все перечисленное

60. Срединный небный шов полностью окостеневает:

Номер правильного ответа: 3

- 1) к 6 годам
- 2) к 9 годам
- 3) после 20 лет

61. Сроки окостенения небного шва

Номер правильного ответа: 1

- 1) влияют на выбор ортодонтического аппарата
- 2) не влияют на выбор ортодонтического аппарата

62. Показания к методике SARPE

Номер правильного ответа: 1

- 1) выраженное сужение верхней челюсти у пациента старше 20 лет
- 2) сужение нижней челюсти
- 3) перекрестный прикус у детей
- 4) скученность зубов

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

63. Окончательный клинический диагноз устанавливается:

Номер правильного ответа: 2

- 1) на основании клинических данных
- 2) после анализа данных клинических и лабораторных исследований
- 3) на основании жалоб пациента
- 4) на основании данных КЛКТ

64. Аппарат Твин-блок используется для лечения

Номер правильного ответа: 3

- 1) скученности зубов
- 2) открытого прикуса
- 3) дистального прикуса
- 4) перекрестного прикуса

65. Ангуляция зуба это

Номер правильного ответа: 2

- 1) вестибуло-оральный наклон зуба
- 2) наклон зуба в мезиодистальном направлении

66. Корпусное перемещение зуба это

Номер правильного ответа: 1

- 1) корень и коронка перемещаются на одинаковое расстояние
- 2) коронка и корень перемещаются в противоположных направлениях
- 3) вращение зуба вокруг своей оси

67. Торк брекета это

Номер правильного ответа: 1

- 1) наклон паза брекета относительно основания
- 2) угол между горизонтальным и вертикальным пазами брекетов
- 3) глубина паза брекета

68. Чем можно компенсировать потерю торка при лечении брекет-системой

Номер правильного ответа: 4

- 1) использовать торковые пружины
- 2) выполнять торковые изгибы
- 3) использовать брекет-системы с селективным выбором торка
- 4) все перечисленное

69. Как называется кривая, проходящая между выступающим бугорком второго моляра и режущими краями резцов на нижней челюсти

Номер правильного ответа: 1

- 1) кривая Шпее
- 2) окклюзионная кривая
- 3) кривая Уилсона

70. Основное назначение вестибулярной дуги

Номер правильного ответа: 1

- 1) ретракция резцов
- 2) протракция резцов
- 3) фиксация аппарата

71. Кламмер Адамса состоит:

Номер правильного ответа: 2

- 1) из плеча и тела
- 2) из плеча, рабочего угла, тела и отростка, фиксирующего кламмер в базисе аппарата +
- 3) из плеча и отростка, фиксирующего кламмер в базисе аппарата

72. Причины промежутка между центральными резцами на верхней челюсти

Номер правильного ответа: 4

- 1) аномалия прикрепления уздечки верхней губы

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

- 2) сверхкомплектный зуб
- 3) адентия боковых резцов
- 4) все перечисленное

73. Минивинты применяются для

Номер правильного ответа: 3

- 1) сокращения сроков лечения
- 2) создания стационарной опоры
- 3) все перечисленное
- 4) ничего из перечисленного

74. По каким показателям классифицируются брекететы

Номер правильного ответа: 1;2;3

- 1) по материалу изготовления
- 2) по принципу фиксации дуги
- 3) по месту фиксации к зубу
- 4) по скорости перемещения зубов

75. Этапы фиксации брекет-системы

Номер правильного ответа: 1

- 1) фиксация брекета на зуб, припасовка дуги, фиксация дуги лигатурами
- 2) припасовка и наложение ортодонтической дуги, фиксация брекета с помощью композита, фиксация лигатур
- 3) припасовка дуги, приклеивание брекетов, фиксация лигатур
- 4) нет правильного варианта

76. В каком направлении делается изгиб по агуляции

Номер правильного ответа: 1

- 1) мезио-дистальном
- 2) вестибуло-оральном
- 3) в любом направлении

77. В каком направлении делается торк-изгиб

Номер правильного ответа: 2

- 1) мезио-дистальном
- 2) вестибуло-оральном
- 3) в любом направлении

78. Как называется первый этап лечения брекет-системой

Номер правильного ответа: 4

- 1) расширение зубной дуги
- 2) юстировка
- 3) контроль торка зубов
- 4) нивелирование и выравнивание

79. Как называется завершающий этап лечения брекет-системой

Номер правильного ответа: 2

- 1) расширение зубной дуги
- 2) юстировка
- 3) контроль торка зубов
- 4) нивелирование и выравнивание

80. Для каких целей применяются ортодонтические микроимплантаты

Номер правильного ответа: 4

- 1) создание стационарной опоры
- 2) дистализации зубов
- 3) мезиализации зубов
- 4) все перечисленное

81. Как называется метод быстрого расширения верхней челюсти

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

Номер правильного ответа: 1

- 1) MARPE
- 2) SARPE
- 3) Le For
- 4) нет правильного варианта

82. Лицевая маска используется

Номер правильного ответа: 1

- 1) только у детей
- 2) только у взрослых
- 3) независимо от возраста

83. Сколько месяцев рекомендуется ношение голубого преортодонтического трейнера Т4К

Номер правильного ответа: 2

- 1) 1-2 месяца
- 2) 6-8 месяцев
- 3) 12 месяцев
- 4) 18 месяцев

84. Сколько месяцев рекомендуется ношение розового упругого трейнера Т4К

Номер правильного ответа: 3

- 1) 1-2 месяца
- 2) 3-4 месяца
- 3) 6-12 месяцев
- 4) 18 месяцев

85. В каком возрасте рекомендуется система брекетов 2x4

Номер правильного ответа: 1

- 1) 8-10 лет
- 2) 6-7 лет
- 3) 12-14 лет
- 4) не зависит от возраста

86. Какое осложнение чаще всего встречается при раннем использовании брекет-системы "2x4"

Номер правильного ответа: 3

- 1) перелом корня
- 2) резорбция корней
- 3) очаговая деминерализация эмали

87. На какие зубы фиксируется брекет-система "2x4"

Номер правильного ответа: 1

- 1) первые постоянные моляры и постоянные резцы верхней челюсти
- 2) вторые молочные моляры и постоянные резцы верхней челюсти
- 3) резцы и клыки
- 4) не имеет значения

88. Показания для применения брекет-системы "2x4"

Номер правильного ответа: 2;3

- 1) дистальный прикус
- 2) скученность резцов на верхней челюсти
- 3) укорочение зубного ряда верхней челюсти
- 4) открытый прикус

89. Виды ретейнеров

Номер правильного ответа: 4

- 1) несъемные проволочные назубные
- 2) съемные пластиночные
- 3) съемные капшовые
- 4) все перечисленные

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

90. Угол бетта используется для диагностики

Номер правильного ответа: 3

- 1) перекрестных аномалий прикуса
- 2) вертикальных аномалий прикуса
- 3) сагиттальных аномалий прикуса

91. Патология ВНЧС, при которой нарушается координация функций жевательных мышц и взаимного расположения суставных элементов, называется

Номер правильного ответа: 2

- 1) анкилоз
- 2) мышечно-суставная дисфункция
- 3) артроз ВНЧС
- 4) мышечный спазм

92. Клинический признак дислокации диска ВНЧС

Номер правильного ответа: 1

- 1) щелчок
- 2) боль при пальпации
- 3) ограничение открывания рта

93. Торковый изгиб относится к изгибам

Номер правильного ответа: 3

- 1) 1 порядка
- 2) 2 порядка
- 3) 3 порядка
- 4) 4 порядка

94. Антропометрическое измерение в точках зу-зу это

Номер правильного ответа: 3

- 1) ширина носа
- 2) глубина черепа
- 3) скуловая ширина
- 4) высота нижней трети лица

95. При лечении вертикальной рпезцовой дизокклюзии целесообразно добавить в конструкцию аппарата

Номер правильного ответа: 2

- 1) наклонную плоскость
- 2) защитку от языка
- 3) щечные щиты
- 4) вестибулярные пелоты

96. Причина диастемы между центральными резцами на верхней челюсти

Номер правильного ответа: 4

- 1) аномалия уздечки верхней губы
- 2) сверхкомплектный зуб
- 3) адентия боковых резцов
- 4) все перечисленное

97. Причина диастемы с параллельным положением корней

Номер правильного ответа: 3

- 1) аномалия уздечки верхней губы
- 2) сверхкомплектный зуб
- 3) адентия боковых резцов
- 4) нет правильного варианта

"98. Углом трансверсального суставного пути (угол беннета) называется угол

"

Номер правильного ответа: 1

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

"1) между линиями сагиттального и трансверсального суставного пути в горизонтальной плоскости

"

"2) между линиями сагиттального и трансверсального суставного пути в вертикальной плоскости

"

"3) между линиями вертикального и трансверсального суставного пути в трансверсальной плоскости

"

99. Регулятор функции Френкеля показан для лечения

Номер правильного ответа: 2

- 1) глубокого прикуса
- 2) мезиального прикуса
- 3) дистального прикуса
- 4) при всех видах патологического прикуса

100. Под изгибом третьего порядка понимают изменение

Номер правильного ответа: 1

- 1) торка зуба
- 2) ангуляции зуба
- 3) вертикального положения зуба
- 4) кривой Шпее

101. Для глубокого прикуса характерно

Номер правильного ответа: 1;2

- 1) зубоальвеолярное укорочение в боковых отделах
- 2) величина резцового перекрытия более 1/2 коронки
- 3) сагиттальная щель
- 4) экструзия моляров

102. На этапе нивелирования зубов брекет-системой используют дуги

Номер правильного ответа: 4

- 1) прямоугольного сечения
- 2) дуги споава ТМА
- 3) стальные дуги
- 4) дуги круглого сечения из сплава никель-титан

103. При лечении брекет-системой выполняют чаще всего изгибы на дугах

Номер правильного ответа: 1

- 1) из сплава ТМА
- 2) из стали
- 3) из термоактивного нитинола

104. Полноразмерная дуга для брекета с пазом 0,022

Номер правильного ответа: 3

- 1) 0,018*0,018
- 2) 018*0,025
- 3) 0,019*0,025
- 4) 0,017*0,025

105. Индекс Пона используется для

Номер правильного ответа: 1

- 1) оценки соотношения ширины верхних и нижних резцов
- 2) для определения нормальной ширины верхней
- 3) оценки степени скученности
- 4) определения пропорциональности центральных и боковых резцов верхней челюсти

106. Шиповидный зуб относится к аномалии

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

Номер правильного ответа: 2;3

- 1) числа зубов
- 2) формы зубов
- 3) размеров зубов
- 4) размеров челюстей

107. В каком возрасте целесообразно проводить ортогнатическую операцию при скелетной форме аномалий прикуса

Номер правильного ответа: 4

- 1) в 14 лет
- 2) в 15 лет
- 3) 18 лет
- 4) индивидуально, в зависимости от степени выраженности анатомических и функциональных нарушений

108. Какая классификация является обязательной при постановке диагноза

Номер правильного ответа: 1

- 1) международная классификация болезней МКБ -X
- 2) классификация Энгля
- 3) классификация Калвеллиса

109. Какой кламмер является кламмером с точечным расположением плеча

Номер правильного ответа: 2

- 1) многозвеньевой кдаммер
- 2) кламмер Адамса
- 3) круглый класммер
- 4) ленточный кламмер

110. Режим медленного расширения верхней челюсти

Номер правильного ответа: 4

- 1) 1 раз в 10 дней
- 2) 1 раз в день
- 3) 2 раза в сутки
- 4) 1 раз в 2 дня

111. Какие бывают ортодонтические дуги по форме

Номер правильного ответа: 4

- 1) форма Damon
- 2) форма Orthos
- 3) форма Lingual
- 4) все ответы правильные

112. Каие бывают дуги по материалу изготовления

Номер правильного ответа: 1;2;3;4

- 1) сплав никеля и титана с добавлением меди
- 2) сплав титана и молибдена
- 3) сплав никеля и титана
- 4) стальные

113. Какие бывают дуги по форме сечения

Номер правильного ответа: 4

- 1) круглые
- 2) прямоугольные
- 3) квадратные
- 4) все ответы правильные

114. Какие дуги используются для закрытия промежутков

Номер правильного ответа: 1;2

- 1) дуги с закрывающими петлями
- 2) дуги с припаянными крючками

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

- 3) реверсионные
- 4) дуги с торковым изгибом

115. Свойства дуги из сплава никеля и титана с добавлением меди

Номер правильного ответа: 4

- 1) устойчивы к постоянной деформации
- 2) используются на начальной и основной фазах лечения
- 3) являются дугами выбора для закрытия промежутков после удаления зуба
- 4) 1,2

116. Дуги, рекомендованные для несъемных ретейнеров

Номер правильного ответа: 1;2

- 1) круглые плетеные
- 2) прямоугольные плетеные
- 3) круглые из сплава никель-титан
- 4) любые из перечисленных

117. Межчелюстные эластики с вектором по 3 классу это эластик от

Номер правильного ответа: 1

- 1) нижних клыков к верхним молярам
- 2) От верхних клыков к нижним молярам
- 3) от верхних резцов к нижним клыкам и резцам
- 4) Нет правильного ответа

118. Межчелюстные эластики с вектором по 2 классу это эластик от

Номер правильного ответа: 2

- 1) нижних клыков к верхним молярам
- 2) От верхних клыков к нижним молярам
- 3) от верхних резцов к нижним клыкам и резцам
- 4) Нет правильного ответа

119. Внеротовые эластики используются в комбинации с

Номер правильного ответа: 3

- 1) лицевой дугой
- 2) лицевой маской
- 3) 1,2
- 4) Нет правильного ответа

120. Элайнеры могут применяться

Номер правильного ответа: 4

- 1) только у взрослых пациентов
- 2) в постоянном прикусе
- 3) в сменном прикусе
- 4) в постоянном и сменном прикусе

121. В нормализации функции дыхания первостепенное значение имеют

Номер правильного ответа: 2

- 1) нормализация осанки, положения головы
- 2) санация носоглотки
- 3) упражнения для нормализации положения языка

122. Медицинская деонтология - это

Номер правильного ответа: 3

- 1) вопросы нравственности
- 2) вопросы коллегиальности
- 3) понятие о долге врача
- 4) взаимоотношения врача и больного

123. Принимать на ортодонтическое лечение детей с нарушенной психикой:

Номер правильного ответа: 1

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

- 1) можно для отдельных больных
- 2) нельзя
- 3) только в детском возрасте
- 4) только взрослых

124. Сроки прорезывания временных резцов

Номер правильного ответа: 1

- 1) 6-12 месяцев
- 2) 12-16 месяцев
- 3) 16-20 месяцев
- 4) 24-30 месяцев

125. I физиологическое повышение прикуса происходит

Номер правильного ответа: 2

- 1) 6-12 месяцев
- 2) 16-24 месяцев
- 3) 24-30 месяцев
- 4) 6-8 лет

126. II физиологическое повышение прикуса происходит

Номер правильного ответа: 3

- 1) 3-4 года
- 2) 9-11 лет
- 3) 6-8 лет
- 4) 12-14 лет

127. III физиологическое повышение прикуса происходит

Номер правильного ответа: 2

- 1) 3-4 года
- 2) 9-11 лет
- 3) 6-8 лет
- 4) 13-14 лет

128. Шов нижней челюсти у ребенка окостеневает

Номер правильного ответа: 1

- 1) после 1 года жизни
- 2) в 3-4 года
- 3) к 5 годам
- 4) после 6 лет

129. IV физиологическое повышение прикуса происходит

Номер правильного ответа: 4

- 1) 3-4 года
- 2) 9-11 лет
- 3) 6-8 лет
- 4) 12-15 лет

130. На прямых ТРГ головы возможно выявить

Номер правильного ответа: 2

- 1) количество и положение зубов
- 2) форму и размеры лицевого отдела черепа
- 3) показания к удалению отдельных зубов перед ортодонтическим лечением
- 4) динамику роста челюстей

131. Определение степени тяжести заболевания

Номер правильного ответа: 3

- 1) достаточно по характеристике диагноза
- 2) возможно на основании рентгенологических исследований
- 3) возможно на основании биометрических исследований
- 4) не требует дополнительного изучения по специальным методикам

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

132. Окончательный клинический диагноз устанавливается

Номер правильного ответа: 2

- 1) на основании жалоб и данных осмотра
- 2) после анализа данных клинических и лабораторных исследований
- 3) на основании симптоматического, топографического, морфологического диагнозов
- 4) на основании данных КЛКТ

133. Объем и сроки ортодонтического лечения зависят преимущественно

Номер правильного ответа: 4

- 1) от степени трудности лечения
- 2) от степени выраженности аномалии
- 3) от количества посещений
- 4) от комплекса перечисленных факторов

134. Степень трудности ортодонтического лечения и его объем

Номер правильного ответа: 1

- 1) находятся в прямой зависимости
- 2) не зависят друг от друга
- 3) находятся в обратной зависимости

135. Асимметрия лица у больных с гнатической формой перекрестного прикуса усиливается в возрасте

Номер правильного ответа: 2

- 1) 3-6 лет
- 2) 10-11 лет
- 3) 12-15 лет
- 4) после 18 лет

136. Применение регулятора функции II типа показано

Номер правильного ответа: 1

- 1) при дистальном прикусе
- 2) при открытом прикусе
- 3) при мезиальном прикусе
- 4) при перекрестном прикусе

137. Показанием для применения аппарата Дерихсвайлера является

Номер правильного ответа: 3

- 1) укорочение зубного ряда верхней челюсти
- 2) удлинение зубного ряда верхней челюсти
- 3) резкое сужение зубного ряда верхней челюсти
- 4) резкое сужение зубного ряда нижней челюсти

138. Аппарат Брюкля действует по принципу

Номер правильного ответа: 3

- 1) орального наклона передних нижних зубов
- 2) вестибулярный наклон передних зубов верхней челюсти
- 3) 1, 2
- 4) сдерживание роста нижней челюсти

139. Использование анатомической ретенции для фиксации съемных ортодонтических аппаратов достигается с помощью

Номер правильного ответа: 4

- 1) кламмеров
- 2) вестибулярных дуг
- 3) окклюзионных накладок
- 4) получения качественного оттиска всех анатомических образований зубных рядов и челюстей

140. Кламмеры классифицируются

Номер правильного ответа: 3

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

- 1) по диаметру проволоки
- 2) по способу изготовления
- 3) по прилеганию плеча к коронке зуба
- 4) по способу фиксации в базисе аппарата

141. Тактикой врача при ранней потере моляров на одной из челюстей при временном нейтральном прикусе является:

Номер правильного ответа: 1

- 1) изготовление съемного протеза
- 2) рентген и наблюдение
- 3) удаление зубов на противоположной челюсти
- 4) закрытие дефекта за счет соседних зубов

142. Причиной, вызывающей поворот зубов по оси, является

Номер правильного ответа: 4

- 1) сужение зубного ряда
- 2) индивидуальная макродонтия
- 3) ранняя потеря отдельных временных зубов и мезиальное смещение позади расположенных зубов
- 4) любая из перечисленных причин

143. Основными причинами ретенции центральных резцов верхней челюсти являются

Номер правильного ответа: 4

- 1) сверхкомплектный зуб
- 2) дефицит места в зубном ряду
- 3) травма
- 4) любая из перечисленных причин

144. Причиной, вызывающей открытый прикус, является

Номер правильного ответа: 4

- 1) вредная привычка сосания пальца
- 2) рахит в раннем возрасте
- 3) короткая язвечка языка и прокладывание языка между зубными рядами
- 4) любая из перечисленных причин

145. При выборе показаний к применению расширяющих аппаратов с винтом ведущим является:

Номер правильного ответа: 2

- 1) недостаток места для имеющихся зубов
- 2) уменьшение ширины зубного ряда
- 3) скученность зубов
- 4) мезиальное смещение боковых зубов

146. В процессе быстрого небного расширения изменения происходят в области

Номер правильного ответа: 4

- 1) небного шва
- 2) скуловых костей
- 3) сошника
- 4) во всех перечисленных

147. Триада при ангидротической эктодермальной дисплазии включает

Номер правильного ответа: 3

- 1) нарушение терморегуляции, осанки, плоскостопие
- 2) адентия, нарушение терморегуляции и осанки
- 3) ангидроз, адентия, гипотрихоз
- 4) ангидроз, гипотрихоз, кривошея

148. Одним из наиболее важных факторов брекет-системы при лечении техникой прямой дуги является

Номер правильного ответа: 4

- 1) выравнивание зубов в зубном ряду и выведение их на окклюзионную линию

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Первая категория.

- 2) правильное расположение брекетов на клинической коронке зуба
- 3) контроль торка, коррекция окклюзионной кривой, закрытие промежутков
- 4) все перечисленное

149. Риски и осложнения в процессе ортодонтического лечения

Номер правильного ответа: 4

- 1) очаговая деминерализация эмали
- 2) резорбция корней
- 3) рецидив после лечения
- 4) все перечисленное

150. Функция ортодонтических микроимплантов состоит в

Номер правильного ответа: 4

- 1) усиление опоры
- 2) сокращение сроков лечения
- 3) альтернатива для внеротовых и внутриротовых дополнительных аппаратов
- 4) все перечисленное