

## Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

1. К профилактическим ортодонтическим аппаратам относятся

Номер правильного ответа: 3

- 1) аппараты механического действия, используемые для лечения зубочелюстных аномалий
- 2) ретенционные аппараты
- 3) аппараты, предупреждающие развитие деформаций зубных рядов и челюстей
- 4) аппараты сочетанного действия, используемые для лечения зубочелюстных аномалий

2. Лечебные аппараты используются для

Номер правильного ответа: 3

- 1) устранения вредных привычек
- 2) нормализации носового дыхания
- 3) исправления положения зубов, формы и размера зубного ряда и нормализации соотношения зубных рядов
- 4) для ретенции результатов лечения

3. Вестибулярная пластинка Хинца относится к аппаратам

Номер правильного ответа: 2

- 1) комбинированного действия
- 2) функционального действия
- 3) механического действия
- 4) сочетанного действия

4. Аппарат Брюкля применяется для лечения

Номер правильного ответа: 4

- 1) ретрузии нижних фронтальных зубов
- 2) скученности зубов
- 3) протрузии верхних фронтальных зубов
- 4) обратного резцового перекрытия

5. В аппарате Брюкля применяется

Номер правильного ответа: 1

- 1) наклонная плоскость
- 2) накусочная площадка
- 3) вестибулярные пелоты
- 4) окклюзионные накладки

6. Аппарат Наас применяется для

Номер правильного ответа: 3

- 1) дистализации моляров
- 2) лечения открытого прикуса
- 3) расширения верхнего зубного ряда
- 4) лечения глубокого прикуса

7. Миотрейнеры - это

Номер правильного ответа: 3

- 1) аппараты механического действия, используемые для лечения зубочелюстных аномалий
- 2) аппараты ретенционные
- 3) аппараты функциональные
- 4) аппараты одночелюстного действия

8. Аппарат Андресена-Гойпля с винтом

Номер правильного ответа: 2

- 1) одночелюстной механического действия
- 2) двухчелюстной комбинированного действия
- 3) функционального действия
- 4) одночелюстной межчелюстного действия

9. Какое направление сил используется для поворота зуба по оси

Номер правильного ответа: 2

- 1) две силы в одном направлении

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

- 2) две силы в противоположном направлении
- 3) одна сила перпендикулярно оси зуба
- 4) одна сила вдоль оси зуба

10. Назовите зубо-челюстные аномалии вызванные инфантильным глотанием

Номер правильного ответа: 1

- 1) открытый прикус
- 2) глубокий прикус
- 3) транспозиция зубов
- 4) перекрестный прикус

11. Назовите ситуацию при котором выражена губо-подбородочной складка

Номер правильного ответа: 3

- 1) асимметрия лица
- 2) увеличение нижней трети лица
- 3) уменьшение нижней трети лица
- 4) открытый прикус

12. Назовите цель пренатальной профилактики

Номер правильного ответа: 1

- 1) нормальное внутриутробное развитие
- 2) повышенное содержание глюкозы в пици беременной
- 3) нормальное развитие на первом году жизни
- 4) завышенные физические нагрузки беременной

13. Укажите в каких клинических ситуациях не возможно измерить ширину зубной дуги методом Попа

Номер правильного ответа: 3;4

- 1) дистопия верхних клыков
- 2) дистопия нижних клыков
- 3) ретенция зуба 46
- 4) разрушение коронки зуба 26

14. Назовите точки, через которые проходит Франкфуртская горизонталь

Номер правильного ответа: 2

- 1) auriculare - gonion
- 2) porion-orbitale
- 3) subnazale - pogonion

15. Укажите значение угла SNB при нижнечелюстной ретрогнатии

Номер правильного ответа: 1

- 1) 70
- 2) 85
- 3) 90
- 4) 100

16. Перечислите клинические признаки аномалия прикуса II/2 по Энгля

Номер правильного ответа: 2;4

- 1) протрузия резцов верхней челюсти
- 2) ретрузия резцов верхней челюсти
- 3) увеличение высоты нижней трети лица
- 4) соотношение моляров по 2 классу

17. Укажите основные помещения зубо-технической лаборатории

Номер правильного ответа: 1;2;4

- 1) гипсовочная
- 2) литейная
- 3) гардероб
- 4) паяльно-сварочная

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

18. Укажите биометрический метод исследования модели, используемый для анализа трансверсальных параметров зубных дуг

Номер правильного ответа: 2

- 1) Korkhaus
- 2) Pont
- 3) Tweed-Merrifield
- 4) Van der Linden

19. Укажите методы создания места в зубной дуге при аномалиях I класса по Энгля

Номер правильного ответа: 2;3

- 1) удаление зубов на верхней челюсти
- 2) расширение
- 3) апроксимальное шлифование
- 4) удаление зубов на нижней челюсти

20. Гиподонтия - это

Номер правильного ответа: 2

- 1) аномалия формы зубов
- 2) аномалия числа зубов
- 3) аномалия структуры зубов
- 4) аномалия положения зубов

21. Метод изучения функции жевания

Номер правильного ответа: 1

- 1) мастикациография
- 2) телерентгенография
- 3) реография
- 4) аксиография

22. Нормальная форма зубной дуги верхней челюсти в постоянном прикусе

Номер правильного ответа: 3

- 1) полукруг
- 2) полуэллипс
- 3) парабола
- 4) трапецевидная

23. Нормальная форма зубной дуги нижней челюсти в постоянном прикусе

Номер правильного ответа: 3

- 1) полукруг
- 2) полуэллипс
- 3) парабола
- 4) трапецевидная

24. Второе физиологическое повышение прикуса происходит с прорезыванием:

Номер правильного ответа: 1

- 1) первого постоянного моляра
- 2) второго постоянного моляра
- 3) клык
- 4) постоянные резцы

25. На верхней челюсти альвеолярная дуга

Номер правильного ответа: 2;4

- 1) меньше апикальной
- 2) больше апикальной
- 3) Больше зубной
- 4) меньше зубной

26. Какая техника наклеивания брекетов требует проведения лабораторного этапа:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прямая

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

- 2) непрямая
- 3) никакая не требует
- 4) обе требуют

27. Какая из нижеперечисленных аномалий зубов не является аномалией размера

Номер правильного ответа: 3;4

- 1) макроденция
- 2) микроденция
- 3) гиподонтия
- 4) адентия

28. У ребенка в возрасте 4 лет физиологической нормой считается

Номер правильного ответа: 1

- 1) дистальные поверхности вторых временных моляров расположены в одной плоскости
- 2) между дистальными поверхностями вторых временных моляров формируется мезиальная ступень
- 3) между дистальными поверхностями вторых временных моляров формируется дистальная ступень

29. Функциональное состояние мышц челюстно-лицевой области определяют методом:

Номер правильного ответа: 1

- 1) электромиографии
- 2) реопародонтографии
- 3) аксиографии
- 4) томографии

30. При «инфантильном» типе глотания у детей формируется

Номер правильного ответа: 3

- 1) глубокий прикус
- 2) перекрестный прикус
- 3) открытый прикус
- 4) дистальный

31. Для глубокого прикуса характерны следующие изменения зубных рядов

Номер правильного ответа: 2

- 1) зубоальвеолярное удлинение во фронтальном и боковых сегментах.
- 2) зубоальвеолярное удлинение во фронтальном, зубоальвеолярное укорочение в боковых сегментах.
- 3) зубоальвеолярное удлинение в боковых сегментах.
- 4) зубоальвеолярное укорочение во фронтальном, зубоальвеолярное удлинение в боковых сегментах.

32. Глубокая резцовая окклюзия – это аномалия окклюзии

Номер правильного ответа: 1

- 1) в вертикальной плоскости
- 2) в сагиттальной плоскости
- 3) в трансверзальной плоскости

33. Открытый прикус – это аномалия окклюзии

Номер правильного ответа: 1

- 1) в вертикальной плоскости
- 2) в сагиттальной плоскости
- 3) в трансверзальной плоскости

34. При втором классе Энгля мезиально-щечный бугор первого моляра верхней челюсти находится

Номер правильного ответа: 3

- 1) в межбугровой фиссуре первого нижнего моляра
- 2) позади межбугровой фиссуры первого нижнего моляра
- 3) впереди от межбугровой фиссуры первого нижнего моляра
- 4) в межбугровой фиссуре второго нижнего моляра

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

35. В результате вредной привычки сосания большого пальца руки у ребенка формируется

Номер правильного ответа: 2

- 1) дистальная окклюзия с ретрузией верхних резцов
- 2) дистальная окклюзия с протрузией верхних резцов
- 3) Дистальная окклюзия с протрузией нижних резцов
- 4) мезиальная окклюзия

36. Мезиальная окклюзия – это аномалия окклюзии

Номер правильного ответа: 2

- 1) в вертикальной плоскости
- 2) в сагиттальной плоскости
- 3) в трансверзальной плоскости

37. Дистальная окклюзия – это аномалия окклюзии

Номер правильного ответа: 2

- 1) в вертикальной плоскости
- 2) в сагиттальной плоскости
- 3) в трансверзальной плоскости

38. Причины развития дистальной окклюзии

Номер правильного ответа: 1;4

- 1) микрогнатия нижней челюсти
- 2) микрогнатия верхней челюсти
- 3) макрогнатия нижней челюсти
- 4) макрогнатия верхней челюсти

39. По классификации Энгля дистальный блокирующий прикус относится к

Номер правильного ответа: 3

- 1) I классу
- 2) II классу 1 подклассу
- 3) II классу 2 подклассу
- 4) III классу

40. На нижней челюсти самой широкой является

Номер правильного ответа: 2

- 1) альвеолярная дуга
- 2) базальная дуга
- 3) зубная дуга

41. На верхней челюсти самой широкой является

Номер правильного ответа: 3

- 1) альвеолярная дуга
- 2) базальная дуга
- 3) зубная дуга

42. К сагиттальным аномалиям окклюзии относится

Номер правильного ответа: 1;3

- 1) мезиальный прикус
- 2) глубокий прикус
- 3) дистальный прикус
- 4) открытый прикус

43. Для устранения вредной привычки сосания пальца применяют пластинку

Номер правильного ответа: 2

- 1) нёбную с вестибулярной дугой
- 2) вестибулярную пластинку
- 3) лицевую дугу
- 4) квадхеликс

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

44. Аппарат Haas применяется для:

Номер правильного ответа: 2

- 1) дистализации моляров верхнего зубного ряда
- 2) расширения верхнего зубного ряда
- 3) Лечения открытого прикуса
- 4) лечения глубокого прикуса

45. Угол SNB на ТРГ определяет положение

Номер правильного ответа: 1

- 1) апикального базиса нижней челюсти в сагитальной плоскости относительно плоскости основания черепа.
- 2) апикального базиса верхней челюсти в сагитальной плоскости относительно плоскости основания черепа.
- 3) взаимное расположение апикальных базисов

46. Угол SNA на ТРГ определяет положение

Номер правильного ответа: 2

- 1) апикального базиса нижней челюсти в сагитальной плоскости относительно плоскости основания черепа.
- 2) апикального базиса верхней челюсти в сагитальной плоскости относительно плоскости основания черепа.
- 3) взаимное расположение апикальных базисов

47. Под «стационарной опорой» следует понимать опору, когда

Номер правильного ответа: 1

- 1) опорные зубы не перемещаются;
- 2) опорные и перемещаемые зубы двигаются навстречу с равной скоростью.

48. Дифференциальную диагностику зубоальвеолярных и гнатических форм прикуса

Номер правильного ответа: 2;4

- 1) клинического обследования пациентов
- 2) изучения боковых ТРГ головы
- 3) изучения диагностических моделей челюстей
- 4) изучения КЛКТ

49. Перекрестная окклюзия – это аномалия окклюзии

Номер правильного ответа: 3

- 1) в вертикальной плоскости
- 2) в сагитальной плоскости
- 3) в трансверзальной плоскости
- 4) в трех плоскостях

50. Рентгенографию кистей рук используют для

Номер правильного ответа: 1

- 1) для прогноза роста челюстей
- 2) для изучения динамики роста организма
- 3) для выяснения аномалий развития скелета
- 4) для диагностики аномалий прикуса

51. Какой из перечисленных аппаратов позволяет провести корпусное перемещение зуба

Номер правильного ответа: 1

- 1) брекет-система
- 2) пластина с вестибулярной дугой
- 3) Съёмная пластинка с рукообразной пружиной.
- 4) трейнер

52. Для глубокого прикуса типичен тип роста лицевого скелета

Номер правильного ответа: 2

- 1) горизонтальный
- 2) вертикальный

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

3) нейтральный

53. Первое физиологическое повышение прикуса происходит в возрасте:

Номер правильного ответа: 1

- 1) 12 месяцев
- 2) 18 месяцев
- 3) 24 месяца
- 4) 36 месяцев

54. Электромиография регистрирует

Номер правильного ответа: 2

- 1) движение ВНЧС
- 2) биопотенциалы мышц челюстно-лицевой области
- 3) гемодинамику мышц челюстно-лицевой области

55. Перемещение анкилозированных зубов

Номер правильного ответа: 2

- 1) возможно
- 2) не возможно

56. Форма зубных дуг в молочном прикусе имеет форму

Номер правильного ответа: 3

- 1) параболы
- 2) полуэллипса
- 3) полукруга
- 4) верх - полуэллипс, низ - парабола

57. Анализ работы врача ортодонта целесообразно проводить с учетом количества

Номер правильного ответа: 2

- 1) посещений больных
- 2) вылеченных детей
- 3) примененных ортодонтических аппаратов
- 4) УЕТ

58. У детей грудного возраста в целях профилактики зубочелюстных аномалий целесообразно применять

Номер правильного ответа: 1

- 1) создание благоприятных условий для правильного вскармливания
- 2) миогимнастику
- 3) вестибулярные пластинки
- 4) все перечисленное

59. Психосоматическое состояние организма человека характеризует

Номер правильного ответа: 3

- 1) 2 типа нервной деятельности
- 2) 3 типа нервной деятельности
- 3) 4 типа нервной деятельности
- 4) 5 типов нервной деятельности

60. Психотерапевтическая подготовка больного перед ортодонтическим лечением

Номер правильного ответа: 2

- 1) необходима всем больным
- 2) необходима отдельным больным
- 3) не нужна
- 4) необходима после определенного возраста

61. Сроки окостенения небного шва

Номер правильного ответа: 1

- 1) влияют на выбор ортодонтического аппарата
- 2) не влияют на выбор ортодонтического аппарата

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

62. Показания к методике SARPE

Номер правильного ответа: 1

- 1) выраженное сужение верхней челюсти у пациента старше 20 лет
- 2) сужение нижней челюсти
- 3) перекрестный прикус у детей
- 4) скученность зубов

63. Окончательный клинический диагноз устанавливается

Номер правильного ответа: 2

- 1) на основании клинических данных
- 2) после анализа данных клинических и лабораторных (дополнительных) исследований
- 3) на основании жалоб пациента
- 4) на основании данных КЛКТ

64. Аппарат Твин-блок используется для лечения

Номер правильного ответа: 3

- 1) скученности зубов
- 2) открытого прикуса
- 3) дистального прикуса
- 4) перекрестного прикуса

65. Аппарат Моушен 3D для лечения

Номер правильного ответа: 1

- 1) дистального прикуса
- 2) перекрестного прикуса
- 3) открытого прикуса

66. Ангуляция зуба это

Номер правильного ответа: 2

- 1) вестибуло-оральный наклон зуба
- 2) наклон зуба в мезиодистальном направлении
- 3) поворот зуба вокруг оси

67. Корпусное перемещение зуба это

Номер правильного ответа: 1

- 1) корень и коронка перемещаются на одинаковое расстояние
- 2) коронка и корень перемещаются в противоположных направлениях
- 3) вращение зуба вокруг своей оси

68. Торк брекета это

Номер правильного ответа: 1

- 1) наклон паза брекета относительно основания
- 2) угол между горизонтальным и вертикальным пазами брекетов
- 3) глубина паза брекета

69. Чем можно компенсировать потерю торка при лечении брекет-системой

Номер правильного ответа: 4

- 1) использовать торковые пружины
- 2) выполнять торковые изгибы
- 3) использовать брекеты с селективным выбором торка
- 4) все перечисленное

70. Как называется кривая, проходящая между выступающим бугорком второго моляра и режущими краями резцов на нижней челюсти

Номер правильного ответа: 1

- 1) кривая Шпее
- 2) Оклюзионная кривая
- 3) кривая Уилсона



## Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

71. Кламмер Адамса состоит:

Номер правильного ответа: 2

- 1) из плеча и тела
- 2) из плеча, рабочего угла, тела и отростка, фиксирующего кламмер в базисе аппарата +
- 3) з плеча и отростка, фиксирующего кламмер в базисе аппарата

72. Тактикой врача при ранней потере моляров на одной из челюстей при временном рикусе является

Номер правильного ответа: 1

- 1) изготовление съемного пластиночного протеза
- 2) наблюдение
- 3) закрытие дефекта за счет соседних зубов

73. Минивинты применяются для

Номер правильного ответа: 3

- 1) сокращения сроков лечения
- 2) создания стационарной опоры
- 3) все перечисленное
- 4) ничего из перечисленного

74. Что входит в элементную базу эджуайз-техники

Номер правильного ответа: 1;2;3

- 1) замковые приспособления - брекететы
- 2) щечные и небные трубки
- 3) ортодонтические дуги квадратного и прямоугольного сечения
- 4) кламмеры

75. Этапы фиксации брекет-системы

Номер правильного ответа: 1

- 1) фиксация брекета на зуб, припасовка дуги, фиксация дуги лигатурами
- 2) припасовка и наложение ортодонтической дуги, фиксация брекета с помощью композита, фиксация лигатур
- 3) припасовка дуги, приклеивание брекетов, фиксация лигатур
- 4) нет правильного варианта

76. В каком направлении делается изгиб по агуляции

Номер правильного ответа: 1

- 1) мезио-дистальном направлении
- 2) вестибуло-оральном направлении
- 3) в любом направлении

77. В каком направлении делается торк-изгиб

Номер правильного ответа: 2

- 1) мезио-дистальном направлении
- 2) вестибуло-оральном направлении
- 3) в любом направлении

78. Как называется первый этап лечения брекет-системой

Номер правильного ответа: 4

- 1) расширение зубной дуги
- 2) юстировка
- 3) контроль торка зубов
- 4) нивелирование и выравнивание

79. Как называется завершающий этап лечения брекет-системой

Номер правильного ответа: 2

- 1) расширение зубной дуги
- 2) юстировка
- 3) контроль торка зубов
- 4) нивелирование и выравнивание

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

80. Риски и осложнения в процессе ортодонтического лечения

Номер правильного ответа: 4

- 1) очаговая деминерализация эмали
- 2) гингивит
- 3) резорбция корней
- 4) все перечисленное

81. Как называется метод быстрого расширения верхней челюсти

Номер правильного ответа: 1

- 1) MARPE
- 2) SARPE
- 3) Le For
- 4) нет правильного варианта

82. Применение ортодонтических микроимплантов

Номер правильного ответа: 4

- 1) делает врача независимым от сотрудничества с пациентом,
- 2) сокращает время лечения, так как возможно одновременно перемещать большие группы зубов
- 3) позволяет менять наклон окклюзионной плоскости
- 4) все перечисленное

83. Что такое ортодонтические микроимпланты

Номер правильного ответа: 1

- 1) титановые или стальные конструкции с винтовой нарезкой
- 2) штифтовая конструкция из стекловолокна

84. Лицевая маска используется

Номер правильного ответа: 1

- 1) только у детей
- 2) только у взрослых
- 3) независимо от возраста

85. Сколько месяцев рекомендуется ношение голубого преортодонтического трейнера T4K

Номер правильного ответа: 2

- 1) 1-2 месяца
- 2) 6-8 месяцев
- 3) 12 месяцев
- 4) 18 месяцев

86. Сколько месяцев рекомендуется ношение розового упругого трейнера T4K

Номер правильного ответа: 3

- 1) 1-2 месяца
- 2) 3-4 месяца
- 3) 6-12 месяцев
- 4) 18 месяцев

87. Какой режим ношения трейнеров рекомендуется

Номер правильного ответа: 4

- 1) только днем
- 2) 1-2 часа
- 3) круглые сутки
- 4) ночь и 2 часа днем

88. В каком возрасте рекомендуется система брекетов 2x4

Номер правильного ответа: 1

- 1) 8-10 лет
- 2) 6-7 лет
- 3) 12-14 лет
- 4) не зависит от возраста

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

89. Какое осложнение чаще всего встречается при раннем использовании брекет-системы "2x4"

Номер правильного ответа: 3

- 1) перелом корня
- 2) резорбция корней
- 3) очаговая деминерализация эмали

90. Показания для применения брекет-системы "2x4"

Номер правильного ответа: 2;3

- 1) дистальный прикус
- 2) скученность резцов на верхней челюсти
- 3) укорочение зубного ряда верхней челюсти
- 4) открытый прикус

91. Виды ретейнеров

Номер правильного ответа: 4

- 1) несъемные проволочные назубные
- 2) съемные пластиночные
- 3) съемные капшовые
- 4) все перечисленные

92. Угол бетта используется для диагностики

Номер правильного ответа: 3

- 1) перекрестных аномалий прикуса
- 2) вертикальных аномалий прикуса
- 3) сагиттальных аномалий прикуса

93. Патология ВНЧС, при которой нарушается координация функций жевательных мышц и взаимного расположения суставных элементов, называется

Номер правильного ответа: 2

- 1) анкилоз
- 2) мышечно-суставная дисфункция
- 3) артроз ВНЧС
- 4) мышечный спазм

94. Клинический признак дислокации диска ВНЧС

Номер правильного ответа: 1

- 1) щелчок
- 2) боль при пальпации
- 3) ограничение открывания рта

95. Торковый изгиб относится к изгибам

Номер правильного ответа: 3

- 1) 1 порядка
- 2) 2 порядка
- 3) 3 порядка
- 4) 4 порядка

96. Антропометрическое измерение в точках зу-зу это

Номер правильного ответа: 3

- 1) ширина носа
- 2) глубина черепа
- 3) скуловая ширина
- 4) высота нижней трети лица

97. Причина диастемы между центральными резцами на верхней челюсти

Номер правильного ответа: 4

- 1) аномалия уздечки верхней губы
- 2) сверхкомплектный зуб
- 3) адентия боковых резцов

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

4) все перечисленное

98. Причина диастемы с параллельным положением корней

Номер правильного ответа: 3

- 1) аномалия уздечки верхней губы
- 2) сверхкомплектный зуб
- 3) адентия боковых резцов
- 4) нет правильного варианта

"99. Углом трансверсального суставного пути (угол беннета) называется угол

"

Номер правильного ответа: 1

"1) между линиями сагиттального и трансверсального суставного пути в горизонтальной плоскости

"

"2) между линиями сагиттального и трансверсального суставного пути в вертикальной плоскости

"

"3) между линиями вертикального и трансверсального суставного пути в трансверсальной плоскости

"

100. Под изгибом третьего порядка понимают изменение

Номер правильного ответа: 1

- 1) торка зуба
- 2) ангуляции зуба
- 3) вертикального положения зуба
- 4) кривой Шпее

101. На этапе нивелирования зубов брекет-системой используют дуги

Номер правильного ответа: 4

- 1) прямоугольного сечения
- 2) дуги спова ТМА
- 3) стальные дуги
- 4) дуги круглого сечения из сплава никель-титан

102. При лечении брекет-системой выполняют чаще всего изгибы на дугах

Номер правильного ответа: 1

- 1) из сплава ТМА
- 2) из стали
- 3) из термоактивного нитинола

103. Прокладывание языка между зубными рядами может приводить к

Номер правильного ответа: 2

- 1) дистальному прикусу
- 2) к открытому прикусу
- 3) к скученности зубов
- 4) к глубокому прикусу

104. Полноразмерная дуга для брекета с пазом 0,022

Номер правильного ответа: 3

- 1) 0,018\*0,018
- 2) 018\*0,025
- 3) 0,019\*0,025
- 4) 0,017\*0,025

105. Индекс Пона используется для

Номер правильного ответа: 1

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

- 1) оценки соотношения ширины верхних и нижних резцов
- 2) для определения нормальной ширины верхней
- 3) оценки степени скученности
- 4) определения пропорциональности центральных и боковых резцов верхней челюсти

106. Шиповидный зуб относится к аномалии

Номер правильного ответа: 2;3

- 1) числа зубов
- 2) формы зубов
- 3) размеров зубов
- 4) размеров челюстей

107. В каком возрасте целесообразно проводить ортогнатическую операцию при скелетной форме аномалий прикуса

Номер правильного ответа: 4

- 1) в 14 лет
- 2) в 15 лет
- 3) 18 лет
- 4) индивидуально, в зависимости от степени выраженности анатомических и функциональных нарушений

108. Какая классификация является обязательной при постановке диагноза

Номер правильного ответа: 1

- 1) международная классификация болезней МКБ -Х
- 2) классификация Энгля
- 3) классификация Калвеллиса

109. Что включает в себя аппарат Motion

Номер правильного ответа: 3

- 1) каппа на нижний или верхний зубной ряд, несъемный элемент с фиксацией на клыки и первые моляры, межчелюстная тяга
- 2) несъемный элемент с фиксацией на клыки и первые моляры, кнопки на первые моляры, межчелюстная тяга
- 3) каппа на нижний или верхний зубной ряд, несъемный элемент с фиксацией на клыки и первые моляры, кнопки на первые моляры, межчелюстная тяга
- 4) каппа на нижний или верхний зубной ряд, несъемный элемент с фиксацией на клыки и первые моляры, кнопки на первые моляры

110. Показания к аппарату ФНТА

Номер правильного ответа: 2

- 1) открытый прикус
- 2) дистальный прикус
- 3) мезиальный прикус
- 4) перекрестный прикус

111. Показания к аппарату Гербста

Номер правильного ответа: 3

- 1) открытый прикус
- 2) перекрестный прикус
- 3) дистальный прикус
- 4) мезиальный прикус

112. Режим медленного расширения верхней челюсти

Номер правильного ответа: 4

- 1) 1 раз в 10 дней
- 2) 1 раз в день
- 3) 2 раза в сутки
- 4) 1 раз в 2 дня

113. Какие бывают ортодонтические дуги по форме

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

Номер правильного ответа: 4

- 1) форма Damon
- 2) форма Orthos
- 3) форма Lingual
- 4) все ответы правильные

114. Какие бывают дуги по материалу изготовления

Номер правильного ответа: 1;2;3

- 1) сплав никеля и титана с добавлением меди
- 2) Сплав титана и молибдена
- 3) Сплав никеля и титана
- 4) нет правильного варианта

115. Какие бывают дуги по форме сечения

Номер правильного ответа: 4

- 1) круглые
- 2) прямоугольные
- 3) квадратные
- 4) все ответы правильные

116. Какие дуги используются для закрытия промежутков

Номер правильного ответа: 1;2

- 1) дуги с закрывающими петлями
- 2) дуги с припаянными крючками
- 3) реверсионные
- 4) дуги с торковым изгибом

117. Свойства дуги из сплава никеля и титана с добавлением меди

Номер правильного ответа: 4

- 1) устойчивы к постоянной деформации
- 2) используются на начальной и основной фазах лечения
- 3) являются дугами выбора для закрытия промежутков после удаления зуба
- 4) 1,2

118. Дуги, рекомендованные для несъемных ретейнеров

Номер правильного ответа: 1;2

- 1) круглые плетеные
- 2) прямоугольные плетеные
- 3) круглые из сплава никель-титан
- 4) любые из перечисленных

119. Межчелюстные эластики с вектором по 3 классу это эластик от

Номер правильного ответа: 1

- 1) нижних клыков к верхним молярам
- 2) от верхних клыков к нижним молярам
- 3) от верхних резцов к нижним клыкам и резцам
- 4) нет правильного ответа

120. Межчелюстные эластики с вектором по 2 классу это эластик от

Номер правильного ответа: 2

- 1) нижних клыков к верхним молярам
- 2) от верхних клыков к нижним молярам
- 3) от верхних резцов к нижним клыкам и резцам
- 4) нет правильного ответа

121. Внеротовые эластики используются в комбинации с

Номер правильного ответа: 3

- 1) лицевой дугой
- 2) лицевой маской
- 3) 1,2

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

4) нет правильного ответа

122. Элайнеры могут применяться

Номер правильного ответа: 4

- 1) только у взрослых пациентов
- 2) в постоянном прикусе
- 3) в сменном прикусе
- 4) в постоянном и сменном прикусе

123. У детей грудного возраста в целях профилактики зубочелюстных аномалий целесообразно применять

Номер правильного ответа: 1

- 1) создание условий для нормального грудного вскармливания
- 2) миотерапию
- 3) нормализацию глотания
- 4) Вестибулярные пластинки

124. В нормализации функции дыхания первостепенное значение имеют

Номер правильного ответа: 2

- 1) нормализация осанки, положения головы
- 2) санация носоглотки
- 3) упражнения для нормализации положения языка

125. Саморегуляция зубочелюстных аномалий наступает в результате:

Номер правильного ответа: 4

- 1) коррекции неправильных окклюзионных контактов за счет физиологической стираемости эмали
- 2) роста челюстей
- 3) устранения вредных привычек
- 4) все перечисленное верно

126. Принимать на ортодонтическое лечение детей с нарушенной психикой:

Номер правильного ответа: 1

- 1) можно для отдельных больных
- 2) нельзя
- 3) только в детском возрасте
- 4) только взрослых

127. Сроки прорезывания временных резцов

Номер правильного ответа: 1

- 1) 6-12 месяцев
- 2) 12-16 месяцев
- 3) 16-20 месяцев
- 4) 24-30 месяцев

128. Шов нижней челюсти у ребенка окостеневает

Номер правильного ответа: 1

- 1) после 1 года жизни
- 2) в 3-4 года
- 3) к 5 годам
- 4) после 6 лет

129. Величину молочных и постоянных зубов сопоставляют:

Номер правильного ответа: 1

- 1) по методике Мичиганского университета
- 2) по методу Долгополовой
- 3) по методу Шварца
- 4) по методу Коркхауза

130. На прямых ТРГ головы возможно выявить

Номер правильного ответа: 2

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

- 1) количество и положение зубов
- 2) форму и размеры лицевого отдела черепа
- 3) показания к удалению отдельных зубов перед ортодонтическим лечением
- 4) динамику роста челюстей

131. Определение степени тяжести заболевания

Номер правильного ответа: 3

- 1) достаточно по характеристике диагноза
- 2) возможно на основании рентгенологических исследований
- 3) возможно на основании биометрических исследований
- 4) не требует дополнительного изучения по специальным методикам

132. Окончательный клинический диагноз устанавливается

Номер правильного ответа: 2

- 1) на основании жалоб и данных осмотра
- 2) после анализа данных клинических и лабораторных исследований
- 3) на основании симптоматического, топографического, морфологического диагнозов
- 4) на основании данных КЛКТ

133. Объем и сроки ортодонтического лечения зависят преимущественно

Номер правильного ответа: 4

- 1) от степени трудности лечения
- 2) от степени выраженности аномалии
- 3) от количества посещений
- 4) от комплекса перечисленных факторов

134. Зубо-альвеолярные разновидности аномалий прикуса характеризует

Номер правильного ответа: 4

- 1) положение зубов
- 2) топография челюстей
- 3) соотношение зубных дуг
- 4) топография зубов, зубных рядов и альвеолярных дуг

135. Глубокий прикус характеризуется

Номер правильного ответа: 1

- 1) нарушением контактов передних зубов с перекрытием больше, чем 1/2 высоты коронок нижних резцов
- 2) нарушением контактов боковых зубов
- 3) нарушением контактов большинства зубов с появлением вертикальной щели

136. Клиническая дифференциальная диагностика смещения нижней челюсти представляет собой несовпадение средней линии:

Номер правильного ответа: 2

- 1) между зубами
- 2) лица и нижней челюсти
- 3) лица и верхнего зубного ряда
- 4) лица и нижнего зубного ряда

137. Асимметрия лица у больных с гнатической формой перекрестного прикуса усиливается в возрасте

Номер правильного ответа: 2

- 1) 3-6 лет
- 2) 10-11 лет
- 3) 12-15 лет
- 4) после 18 лет

138. Применение регулятора функции II типа показано

Номер правильного ответа: 1

- 1) при дистальном прикусе
- 2) при открытом прикусе



Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

- 3) при мезиальном прикусе
- 4) при перекрестном прикусе

139. Показанием для применения аппарата Дерихсвайлера является:

Номер правильного ответа: 3

- 1) укорочение зубного ряда верхней челюсти
- 2) удлинение зубного ряда верхней челюсти
- 3) резкое сужение зубного ряда верхней челюсти
- 4) резкое сужение зубного ряда нижней челюсти

140. Кламмеры классифицируются

Номер правильного ответа: 3

- 1) по диаметру проволоки
- 2) по способу изготовления
- 3) по прилеганию плеча к коронке зуба
- 4) по способу фиксации в базисе аппарата

141. Тактикой врача при ранней потере моляров на одной из челюстей при временном нейтральном прикусе является:

Номер правильного ответа: 1

- 1) изготовление съемного протеза
- 2) рентген и наблюдение
- 3) удаление зубов на противоположной челюсти
- 4) закрытие дефекта за счет соседних зубов

142. Основными причинами ретенции центральных резцов верхней челюсти являются

Номер правильного ответа: 4

- 1) сверхкомплектный зуб
- 2) дефицит места в зубном ряду
- 3) травма
- 4) любая из перечисленных причин

143. Причиной, вызывающей открытый прикус, является

Номер правильного ответа: 4

- 1) вредная привычка сосания пальца
- 2) рахит в раннем возрасте
- 3) коротка язвечка языка и прокладывание языка между зубными рядами
- 4) любая из перечисленных причин

144. При выборе показаний к применению расширяющих аппаратов с винтом ведущим является:

Номер правильного ответа: 2

- 1) недостаток места для имеющихся зубов
- 2) уменьшение ширины зубного ряда
- 3) скученность зубов
- 4) мезиальное смещение боковых зубов

145. Быстро и эффективно вылечить глубокий прикус можно

Номер правильного ответа: 2

- 1) в периоде временного прикуса от 2,5 до 5 лет
- 2) в начальном периоде смешанного прикуса от 6 до 9 лет
- 3) в периоде постоянного прикуса
- 4) в любом возрасте

146. В процессе быстрого небного расширения изменения происходят в области

Номер правильного ответа: 4

- 1) небного шва
- 2) скуловых костей
- 3) сошника
- 4) во всех перечисленных

Тесты на аттестацию. Ортодонтия. Высшая категория.

147. Триада при ангидротической эктодермальной дисплазии включает

Номер правильного ответа: 3

- 1) нарушение терморегуляции, осанки, плоскостопие
- 2) адентия, нарушение терморегуляции и осанки
- 3) ангидроз, адентия, гипотрихоз
- 4) ангидроз, гипотрихоз, кривошея

148. При исправлении положения аномалийно стоящего зуба необходимо соблюсти следующие физические условия

Номер правильного ответа: 4

- 1) использовать силу и опору
- 2) опору и фиксацию
- 3) силу, опору, фиксацию
- 4) устранить препятствия на пути перемещения, создать место, использовать силу, опору, фиксацию

149. Одним из наиболее важных факторов брекет-системы при лечении техникой прямой дуги является

Номер правильного ответа: 4

- 1) выравнивание зубов в зубном ряду и выведение их на окклюзионную линию
- 2) правильное расположение брекетов на клинической коронке зуба
- 3) контроль торка, коррекция окклюзионной кривой, закрытие промежутков
- 4) все перечисленное

150. Риски и осложнения в процессе ортодонтического лечения

Номер правильного ответа: 4

- 1) очаговая деминерализация эмали
- 2) резорбция корней
- 3) рецидив после лечения
- 4) все перечисленное