

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

1. Наиболее частой причиной инфаркта миокарда у лиц молодого возраста является

Номер правильного ответа: 5

- 1) тромбоз коронарных артерий
- 2) эмболия
- 3) васкулит
- 4) атеросклероз
- 5) длительный спазм коронарных артерий

2. Тахикардия, нарушение ритма, одышка, боль за грудиной с иррадиацией, неэффективность неоднократного приема нитроглицерина свидетельствуют в пользу

Номер правильного ответа: 4

- 1) пароксизмальной тахикардии
- 2) стенокардии напряжения
- 3) стенокардии покоя
- 4) инфаркта миокарда
- 5) коллапса

3. Фазы большого эпилептического припадка: 1. аура; 2. фаза тонических судорог; 3. фаза клонических судорог; 4. беспричинный смех; 5. беспокойство. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 1

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

4. Употреблением стакана сахаросодержащих напитков можно купировать

Номер правильного ответа: 4

- 1) обморок
- 2) коллапс
- 3) гипергликемию
- 4) гипогликемию
- 5) анафилактический шок

5. Для клинической картины гипогликемии нехарактерен симптом

Номер правильного ответа: 5

- 1) чувства голода
- 2) общей слабости
- 3) влажность кожных покровов
- 4) тремора пальцев
- 5) спутанность сознания, вплоть до его потери

6. Для гипогликемии характерен симптом

Номер правильного ответа: 1

- 1) снижение глюкозы крови
- 2) запах ацетона изо рта
- 3) глубокое, шумное дыхание
- 4) снижение мышечного тонуса
- 5) ацетонурия

7. Для гипергликемии характерен симптом

Номер правильного ответа: 4

- 1) снижение глюкозы крови
- 2) запах ацетона изо рта
- 3) поверхностное дыхание
- 4) диплопия
- 5) ацетонурия

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

8. Выраженный цианоз, резкая одышка, отсутствие двигательной активности, участие дополнительных мышц в акте дыхания, вздутие шейных вен, выбухание надключичных ямок характеризуют

Номер правильного ответа: 2

- 1) асфиксию обтурационную
- 2) приступ бронхиальной астмы
- 3) большой эпилептический припадок
- 4) приступ стенокардии
- 5) гипервентиляцию

9. Какие лекарства реже других могут вызвать анафилаксию

Номер правильного ответа: 5

- 1) местнообезболивающие
- 2) антибиотики
- 3) витамины
- 4) органные препараты
- 5) вазоконстрикторы

10. Наиболее вероятна анафилаксия в отношении

Номер правильного ответа: 3

- 1) гормонов
- 2) наркотических анальгетиков
- 3) препаратов йода
- 4) транквилизаторов
- 5) витаминов

11. Доминирующим симптомом системной анафилаксии является

Номер правильного ответа: 3

- 1) диссеминированное внутрисосудистое свертывание
- 2) кардиогенный шок
- 3) гипертонический криз
- 4) сосудистый коллапс
- 5) судороги

12. Острое нарушение внешнего дыхания характеризуется: 1. цианозом; 2. выраженной тахикардией; 3. ортопноэ; 4. одышкой; 5. палящими болями в сердце. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 1

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

13. Тремя признаками, достаточными для диагностики состояния клинической смерти, являются: 1. апноэ; 2. асистолия; 3. арефлексия; 4. широкий зрачок; 5. отсутствие роговичного рефлекса. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 1

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

14. При неэффективности приемов, способствующих удалению инородных тел из дыхательных путей, производят

Номер правильного ответа: 3

- 1) трахеотомию
- 2) трахеостомию
- 3) коникотомию

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 4) цистотомию
- 5) остеотомию

15. Уровень резистентности организма к кариозному процессу снижают

Номер правильного ответа: 2

- 1) зубные отложения
- 2) различные общие заболевания, связанные с нарушением регуляции обменных процессов в организме
- 3) углеводы пищи
- 4) недостаточное содержание фтора в питьевой воде
- 5) все вышеперечисленное

16. Для клиновидного дефекта характерно

Номер правильного ответа: 5

- 1) появление после прорезывания зубов
- 2) локализация в пришеечной области
- 3) характерная форма клина
- 4) редкое развитие гиперестезии
- 5) все выше перечисленное

17. Для лечения гиперестезии твердых тканей зубов применяют: 1. 3% раствор дикаина, жидкость Платонова; 2. глубокое фторирование; 3. препараты серебра; 4. десенситайзеры ( Seal and Protect, Gluma Desensitizer); 5. фторлак. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 3

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 2
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

18. При общем лечении постлучевого некроза твердых тканей зубов применяют: 1. антиоксиданты; 2. препараты кальция и поливитамины; 3. гормональные препараты; 4. анестетики; 5. десенсибилизирующие препараты. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 2

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 2
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

19. При препарировании кариозной полости скол эмали (фальц) формируется

Номер правильного ответа: 5

- 1) всегда
- 2) не формируется в полостях 3 класса
- 3) не формируется в полостях 5 класса
- 4) не формируется никогда
- 5) не формируется на окклюзионной поверхности

20. К компомерам относится

Номер правильного ответа: 5

- 1) Evicrol
- 2) Herculite XRV
- 3) Revolution
- 4) Dyract AP
- 5) Vitremer

21. Положительными свойствами микрофилов являются

Номер правильного ответа: 5

- 1) хорошая полируемость и стойкость глянцевой поверхности
- 2) высокая цветостабильность

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 3) эластичность
- 4) низкий абразивный износ
- 5) все выше перечисленное

22. Отрицательными свойствами микрогибридных композитов являются

Номер правильного ответа: 5

- 1) не идеальное качество поверхности (хуже, чем у микрофилов)
- 2) сложность клинического применения
- 3) недостаточная прочность и пространственная стабильность при пломбировании обширных дефектов 2 и 4 классов
- 4) трудоемкость моделирования пломбы и заполнения материалом ретенционных углублений и придесневой стенки
- 5) все выше перечисленное

23. Наиболее ценным качеством текучих композитов является

Номер правильного ответа: 3

- 1) высокая прочность
- 2) отличные эстетические характеристики
- 3) высокая эластичность, тиксотропность
- 4) низкая полимеризационная усадка
- 5) высокая пространственная стабильность

24. К текучим композитам относятся: 1. FiltekFlow; 2. Sure Fill; 3. Flow Line; 4. Tetric Ceram; 5. Durafil. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 2

- 1) если правильны ответы 1, 2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 2
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5

25. Выберите материал, относящийся к группе СИЦ двойного отверждения

Номер правильного ответа: 3

- 1) Silux Plus
- 2) Vitremer
- 3) Time Line
- 4) Revolution
- 5) Dyract Flou

26. При реставрации дефектов 5 класса предпочтительно использование

Номер правильного ответа: 4

- 1) амальгамы
- 2) традиционных микрогибридов
- 3) стеклоиономерных цементов
- 4) текучих композитов и компомеров, микрофилов
- 5) макрофилов

27. При пломбировании полостей 3-4 классов линейная прокладка ставится

Номер правильного ответа: 4

- 1) из фосфатцемента
- 2) компомера
- 3) традиционного СИЦ
- 4) гибридного СИЦ двойного отверждения
- 5) не имеет значения

28. Исход лечения начального кариеса считается успешным

Номер правильного ответа: 5

- 1) пигментация пятна
- 2) уменьшение размеров пятна
- 3) ослабление прокрашиваемости пятна

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 4) исчезновение пятна
- 5) любой из указанных

29. Профилактику кариеса зубов необходимо осуществлять

Номер правильного ответа: 5

- 1) в детском возрасте
- 2) у подростков
- 3) у беременных
- 4) у взрослых
- 5) на протяжении всей жизни человека

30. После лечения кариеса зубов могут возникать: 1. осложнения воспаление и некроз пульпы; 2. вторичный кариес; 3. папиллит; 4. травматический верхушечный периодонтит; 5. нарушение окклюзии. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 5

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 2
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

31. Решающим в дифференциальной диагностике глубокого кариеса и хронического фиброзного пульпита является

Номер правильного ответа: 2

- 1) характер болей
- 2) термометрия
- 3) зондирование
- 4) электроодонтометрия
- 5) фактор времени

32. Клеточный состав пульпы следующий

Номер правильного ответа: 2

- 1) пульпа как соединительная ткань богата присущими ей клетками
- 2) кроме клеток, присущих соединительной ткани и специфических клеток, пульпа содержит малодифференцированные, звездчатые клетки
- 3) клеточный состав пульпы представлен клетками плазмочитарного и макрофагального рядов
- 4) близки по составу к эпителиальной ткани
- 5) похожа на нервную ткань

33. В строении корневой и коронковой пульпы имеются различия

Номер правильного ответа: 2

- 1) нет, ибо корневая -пульпа является непрерывным продолжением коронковой
- 2) корневая пульпа значительно отличается от коронковой по строению, ибо она является промежуточной между коронковой пульпой и периодонтитом
- 3) корневая пульпа незначительно отличается от коронковой, по строению она ближе к ней, чем к периодонту
- 4) корневая пульпа близка к ткани периодонта
- 5) коронковая пульпа близка к нервной ткани

34. В строении коронковой и корневой пульпы отличия состоят

Номер правильного ответа: 3

- 1) в особенностях строения волокон соединительной ткани в этих зонах
- 2) в особенности васкуляризации
- 3) в соотношении волокон, клеток и межучного вещества
- 4) в особенностях строения соединительной ткани, ее кровоснабжения и иннервации
- 5) корневая пульпа близка к тканям: периодонтита

35. Основная функция пульпы

Номер правильного ответа: 3

- 1) трофическая, ибо через пульпу осуществляется обмен в твердых тканях зуба

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 2) пластическая — способность воссоздавать элементы соединительной ткани и заместительной дентин
- 3) защитная — способность сопротивляться раздражающему агенту
- 4) пульпа индифферентна по отношению к твердым тканям
- 5) пульпа безвредна для твердых тканей

36. Защитная функция пульпы определяется

Номер правильного ответа: 3

- 1) деятельностью клеток фибробластического ряда, способных ограничивать воспалительный процесс
- 2) фагоцитарной активностью клеток
- 3) способностью одонтобластов вырабатывать заместительный дентин
- 4) волокнистыми структурами, способными выравнять рН пульпы
- 5) тканевым иммунитетом, который определяется совместной деятельностью вышеперечисленных тканевых элементов, а также нейро-рефлекторной и гуморальной регуляцией организма

37. Решающим при диагностике острого пульпита является

Номер правильного ответа: 5

- 1) характер болей
- 2) термометрия
- 3) электрометрия
- 4) перкуссия
- 5) фактор времени и первичность болей

38. Из предложенных методов лечения наиболее рационально применять при остром пульпите

Номер правильного ответа: 4

- 1) девитализацию пульпы
- 2) сохранение жизнеспособности всей пульпы
- 3) витальную ампутацию
- 4) витальную экстирпацию
- 5) удаление зуба

39. При хроническом пульпите лучше всего применить

Номер правильного ответа: 3

- 1) сохранение жизнеспособности всей пульпы
- 2) витальную ампутацию
- 3) витальную экстирпацию
- 4) девитализацию
- 5) удаление зуба

40. При биологических методах лечения пульпита возникающие осложнения связаны

Номер правильного ответа: 1

- 1) с ошибками в диагнозе
- 2) с неправильным выбором лекарственного препарата
- 3) с плохой фиксацией пломбы
- 4) с нарушением правил асептики
- 5) с ошибками в технике проведения метода

41. Большой процент несовпадений клинического и гистологического диагнозов пульпита объясняется

Номер правильного ответа: 1

- 1) несовершенством методов диагностики пульпитов
- 2) поздним обращением больных
- 3) особенностью клинического течения, выражающегося в закрытой полости зуба
- 4) гиперэргическим характером воспаления
- 5) не назван

42. Основные свойства коллагеновых волокон периодонта

Номер правильного ответа: 1

- 1) удерживают зуб в правильном положении, равномерно распределяя давление на стенки

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 2) способны набухать в кислой среде, окрашивая ее
- 3) создают благоприятные условия для фагоцитоза при воспалении
- 4) обеспечивают физиологическую подвижность зуба
- 5) устойчивы к переваривающему действию тканевых ферментов и играют большое значение в репаративных процессах.

43. Решающим тестом в дифференциальной диагностике острого периодонтита и пульпита являются

Номер правильного ответа: 1

- 1) перкуссия
- 2) электроодонтодиагностика, термометрия
- 3) характер болей
- 4) термометрия
- 5) рентгенодиагностика

44. Наибольшие трудности для достижения верхушечного отверстия и подготовки к пломбированию 16 или 26 зуба представляет

Номер правильного ответа: 2

- 1) дистальный небный
- 2) медиальный щечный
- 3) щечный
- 4) дистальный щечный
- 5) небный

45. Принятая рабочая длина корневого канала

Номер правильного ответа: 2

- 1) точно соответствует анатомической длине зуба
- 2) короче на 1 мм, чем анатомическая длина зуба
- 3) длиннее на 1 мм, чем анатомическая длина зуба
- 4) иногда равна длине глубиномера (по субъективным ощущениям)
- 5) всегда равна длине глубиномера (по субъективным ощущениям)

46. Корневая пломба должна

Номер правильного ответа: 4

- 1) достигать верхушечной трети канала
- 2) достигать верхушечного отверстия по рентгенологической оценке
- 3) быть на 1-2 мм дальше верхушечного отверстия
- 4) располагать на 1 мм до верхушечного отверстия по рентгено-логической оценке
- 5) достигать уровня дентино-цементного соединения

47. Чаще всего бессимптомны

Номер правильного ответа: 4

- 1) острый пульпит
- 2) хронический открытый пульпит
- 3) хронический закрытый пульпит
- 4) дентикл
- 5) полип пульпы

48. Согласно общему плану лечения, лечебные мероприятия (кроме неотложных случаев) нужно начинать с

Номер правильного ответа: 3

- 1) выявления кариеса
- 2) лечение заболеваний пародонта
- 3) профессиональная гигиена полости рта
- 4) эндодонтическое лечение
- 5) удаление зубов, которые нельзя сохранить

49. Рентгенологические признаки деструкции кости можно определить, если

Номер правильного ответа: 4

- 1) правильно выполнен снимок и проявлена пленка

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 2) в периапикальной области имеется резорбция губчатой кости
- 3) прояску выполнит с контролем времени и температуры
- 4) происходит резорбция внутренней или наружной кортикаль-ной кости
- 5) исследование проведено с помощью радиовизиографии

50. Наиболее широко приемлемым внутриканальным ирригантом имеющим оптимальные очищающие и бактерицидные свойства, является

Номер правильного ответа: 4

- 1) формапрезол
- 2) перекись водорода
- 3) стерильный физраствор
- 4) гипохлорит натрия
- 5) хлоргексидин

51. Проверка проходимости канала (рекапитуляция) это

Номер правильного ответа: 5

- 1) последовательное использование инструментов возрастающих размеров для расширения канала
- 2) удаление дентинных опилок инструментом меньшего разме-ра, чем окончательный инструмент для обработки апикальной части канала в сочетании с обильной ирригации
- 3) использование файла № 35 для очистки апекса
- 4) опиливающие движения Н — файла
- 5) использование флехо- инструментов

52. Инструмент используемый при пломбировании корневых каналов методом латеральной конденсации холодной гуттаперчи

Номер правильного ответа: 5

- 1) плагер
- 2) ример
- 3) лентуло
- 4) корневая игла
- 5) спредер

53. Инструмент используемый при пломбировании корневых каналов методом вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи

Номер правильного ответа: 5

- 1) лентуло
- 2) файл № 35
- 3) зонд
- 4) спредер
- 5) плагер

54. Основные требования, предъявляемые к материалам для пломбирования корневых каналов

Номер правильного ответа: 3

- 1) легко вводится в корневой канал
- 2) обладать медленным отверждением
- 3) не обладать токсическим, аллергенным, мутагенным и канце-рогенным действием
- 4) не окрашивает ткани зуба
- 5) при необходимости легко извлекаться из канала

55. Эпоксидным является

Номер правильного ответа: 5

- 1) Endomethasone
- 2) Ketac - Endo
- 3) Apexin
- 4) Sealapex
- 5) AN - 26

56. При отсутствии реакции на ток 100 мкА можно предположить

Номер правильного ответа: 3

- 1) средний кариес

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 2) интактный зуб
- 3) хронический периодонтит
- 4) гангренозный пульпит
- 5) глубокий кариес

57. При остром гнойном периодонтите преобладают микроорганизмы

Номер правильного ответа: 4

- 1) аэробы
- 2) ассоциации аэробов и факультативных анаэробов
- 3) ассоциации аэробов и облигатных анаэробов
- 4) ассоциации факультативных и облигатных анаэробов
- 5) факультативные анаэробы

58. Наиболее оптимальным для закрытия перфорации корня является

Номер правильного ответа: 3

- 1) фосфат-цемент
- 2) стеклоиономерные цементы
- 3) Pro Root МТА
- 4) серебряная амальгама
- 5) препараты на основе гидроксида кальция

59. В состав корневых силеров вводится гидроокись кальция

Номер правильного ответа: 3

- 1) для рентгеноконтрастности
- 2) для стимуляции дентина — цементогенеза
- 3) для стимуляции остеогенеза
- 4) для противовоспалительной терапии
- 5) для адекватной биосовместимости материала

60. Укажите основные свойства комплексонов или хелатных веществ, которые используются при инструментальной обработке корневых каналов

Номер правильного ответа: 2

- 1) антисептическое действие
- 2) декальцинация дентина
- 3) увлажнение канала
- 4) усиление режущих свойств эндодонгических инструментов
- 5) противовоспалительное действие

61. Решающий тест при дифференциальной диагностике острого периодонтита и острого пульпита постоянного сформированного зуба

Номер правильного ответа: 2

- 1) перкуссия
- 2) электроодонтодиагностика
- 3) характер болей
- 4) термометрия
- 5) рентгендиагностика

62. Из перечисленных некариозных поражений зубов возникают после их прорезывания

Номер правильного ответа: 1

- 1) травма, эрозия, клиновидный дефект
- 2) флюороз зубов
- 3) гипоплазия эмали
- 4) гиперплазия эмали
- 5) наследственные нарушения развития зубов

63. Назовите формы клинического проявления гипоплазии эмали

Номер правильного ответа: 5

- 1) пятнистая
- 2) штриховая, чашеобразная
- 3) эрозивная

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 4) бороздчатая
- 5) все перечисленные

64. При диф.диагностике кариеса в стадии пятна и флюороза решающим является  
Номер правильного ответа: 5

- 1) локализация процесса
- 2) симметричность поражения
- 3) консистенция поверхности пятна
- 4) прогрессирование процесса
- 5) системность поражения

65. Пятнистую форму системной гипоплазии следует дифференцировать  
Номер правильного ответа: 2

- 1) пятнистой формой флюороза и местной гипоплазии, кариесом в стадии пятна
- 2) поверхностным кариесом
- 3) штриховой формой гипоплазии
- 4) штриховой формой флюороза
- 5) меловидно-крапчатой формой флюороза

66. Эрозивную форму гипоплазии следует дифференцировать: 1. с меловидно-крапчатой и эрозивной формой флюороза; 2. поверхностным и средним кариесом; 3. клиновидным дефектом; 4. глубоким кариесом; 5. патологической стираемостью зубов. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 1

- 1) если правильны ответы 1,2
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

67. Для клиновидного дефекта характерно

Номер правильного ответа: 5

- 1) появление после прорезывания зубов
- 2) локализация в пришеечной области
- 3) характерная форма клина
- 4) редкое развитие гиперестезии
- 5) все выше перечисленное

68. Абсолютным показанием к отбеливанию зубов является

Номер правильного ответа: 1

- 1) поверхностная пигментация, преимущественно желто-коричневого оттенка возрастные изменения цвета зубов
- 2) зубы, измененные в цвете в результате некачественного эндодонтического лечения
- 3) тетрациклиновые зубы
- 4) зубы, измененные в цвете из-за коррозии амальгамы
- 5) флюорозные зубы

69. Назовите наиболее серьезные осложнения при отбеливании зубов: 1. переотбеливание (меловидные зубы без блеска); 2. раздражение десен и окружающих тканей вследствие химического ожога; 3. недостаточная эффективность отбеливания; 4. резорбция тканей пришеечной области; 5 .изменение поверхностной структуры композиционных мате-риалов.  
Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 3

- 1) если правильны ответы 1,2
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

70. Фактором, способствующим развитию гипоплазии, является

Номер правильного ответа: 2

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 1) несовершенный остеогенез
- 2) нарушение обмена вещества при болезнях раннего детского возраста
- 3) содержание фтора в питьевой воде
- 4) инфицирование фолликула при травме
- 5) неясная причина

71. Характерными жалобами при гипоплазии являются

Номер правильного ответа: 4

- 1) повышенная чувствительность
- 2) стертость эмали
- 3) все вышеперечисленное
- 4) изменение цвета и формы зубов
- 5) жалобы отсутствуют

72. Наиболее типичной локализацией дефектов зубов при гипоплазии является

Номер правильного ответа: 4

- 1) вестибулярная поверхность всех групп зубов
- 2) фиссуры
- 3) шейка фронтальных зубов
- 4) вестибулярная поверхность резцов, клыков и бугров первых моляров
- 5) различные участки эмали

73. В базовую программу обязательного медицинского страхования входят

Номер правильного ответа: 1

- 1) перечень видов и объемов медицинских услуг, осуществляемых за счет средств ОМС
- 2) стоимость различных видов медицинской помощи
- 3) организация добровольного медицинского страхования
- 4) виды платных медицинских услуг
- 5) дифференциация подушевой стоимости медицинской помощи в зависимости от пола и возраста.

74. Основанием допуска к медицинской (фармацевтической) деятельности являются документы

Номер правильного ответа: 2

- 1) диплом об окончании высшего или среднего медицинского (фармацевтического) заведения
- 2) сертификат
- 3) лицензия
- 4) свидетельство об окончании курсов
- 5) запись в трудовой книжке

75. Основную ответственность за клинический диагноз несет

Номер правильного ответа: 4

- 1) зубной техник
- 2) помощник стоматолога (сестра)
- 3) помощник стоматолога, получивший сертификат
- 4) врач-стоматолог
- 5) главный врач стоматологической поликлиники

76. Избавляет от возможных необоснованных обвинений в адрес врача после проведенного не совсем удачного лечения

Номер правильного ответа: 5

- 1) только тщательная запись выполненных манипуляций
- 2) запись предписаний
- 3) сниженный прейскурант
- 4) запись обращений к специалистам
- 5) запись полного анамнеза и тщательная запись выполненных манипуляций

77. Очистку, обработку и стерилизацию стоматологических наконечников следует проводить

Номер правильного ответа: 5

- 1) обязательная стерилизация
- 2) достаточно дезинфекции
- 3) необходима предстерилизационная подготовка с последующей дезинфекцией

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 4) обязательна дезинфекция и стерилизация
- 5) стерилизация с предварительной предстерилизационной подготовкой

78. Формируя диспансерные группы у стоматолога необходимо учитывать: 1) форму активности кариеса; 2) уровень соматического и стоматологического здоровья; 3) факторы риска возникновения заболеваний; 4) факторы риска утяжеления патологии; 5) уровень стоматологического здоровья. Выберите правильный ответ по схеме:

Номер правильного ответа: 5

- 1) если правильны ответы 1, 2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5

79. Общественное здоровье характеризуют показатели

Номер правильного ответа: 1

- 1) трудовая активность населения
- 2) заболеваемость
- 3) инвалидность
- 4) демографические показатели
- 5) физическое развитие населения

80. Основными задачами поликлиники являются

Номер правильного ответа: 3

- 1) медицинская помощь больным на дому
- 2) лечебно-диагностическое обслуживание населения
- 3) организация работы по пропаганде здорового образа жизни
- 4) профилактическая работа
- 5) экспертиза временной нетрудоспособности

81. Организация мер по сокращению затраты времени пациентов на посещение поликлиники включает

Номер правильного ответа: 2

- 1) анализ интенсивности потока больных по времени
- 2) нормирование деятельности врачей
- 3) правильную организацию графика приема врачей
- 4) четкую работу регистратуры
- 5) дисциплину персонала

82. В базовую программу обязательного медицинского страхования входят

Номер правильного ответа: 3

- 1) перечень видов и объемов медицинских услуг, осуществляемых за счет средств ОМС
- 2) стоимость различных видов медицинской помощи
- 3) организация добровольного медицинского страхования
- 4) виды платных медицинских услуг
- 5) дифференциация подушевой стоимости медицинской помощи в зависимости от пола и возраста

83. Квалификационная категория, присвоенная врачам, провизорам, работникам из среднего медицинского (фармацевтического) персонала действительна

Номер правильного ответа: 1

- 1) 5 лет
- 2) 3 года
- 3) 7 лет
- 4) 1 год
- 5) 6 лет

84. Минимальная площадь помещения для расположения стоматологического кресла

Номер правильного ответа: 3

- 1) 10 кв.м.
- 2) 12 кв.м.

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 3) 14 кв.м.
- 4) 16 кв.м.
- 5) 18 кв.м.

85. Время действия сертификата специалиста-стоматолога

Номер правильного ответа: 3

- 1) 1 год
- 2) 3 года
- 3) 5 лет
- 4) 7 лет
- 5) 9 лет

86. Наиболее информативным для определения гигиенического состояния полости рта у взрослых является индекс:

Номер правильного ответа: 2

- 1) Федорова-Володкиной
- 2) Грин-Вермиллиона
- 3) РНР
- 4) кпу(п)
- 5) СРІТН

87. Индекс Грин-Вермиллиона используется для определения:

Номер правильного ответа: 2

- 1) интенсивности кариеса
- 2) зубного налета, зубного камня
- 3) кровоточивости десен
- 4) распространенности кариеса
- 5) глубины пародонтального кармана

88. При определении гигиенического состояния полости рта с помощью индекса Федорова-Володкиной окрашиваются:

Номер правильного ответа: 2

- 1) вестибулярные поверхности 6 верхних фронтальных зубов
- 2) вестибулярные поверхности 6 нижних фронтальных зубов
- 3) язычные поверхности первых постоянных моляров
- 4) вестибулярные поверхности верхних и нижних резцов
- 5) вестибулярные поверхности всех групп зубов верхней и нижней челюсти

89. При определении гигиенического состояния полости рта и при окрашивания зубного налета используют растворы:

Номер правильного ответа: 4

- 1) метиленового синего
- 2) 5% спиртовой раствор йода
- 3) 5% спиртовой раствор йода
- 4) раствор Шиллера-Писарева
- 5) 0,25% спиртовой раствор хлорофиллипта

90. Метод термометрии нужно использовать:

Номер правильного ответа: 1

- 1) для дифференциальной диагностики кариеса и пульпита
- 2) для диагностики периодонтита
- 3) для дифференциальной диагностики периодонтита и невралгии тройничного нерва
- 4) при перфорации в области бифуркации
- 5) при переломе корня

91. Для дифференциальной диагностики начального кариеса используются методы:

Номер правильного ответа: 1

- 1) зондирование
- 2) ЭОД
- 3) рентгенологический

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 4) определение индексов гигиены
- 5) термометрии

92. Значение рН зубного налета оценивается как критическое при значении:

Номер правильного ответа: 2

- 1) 7,0-7,5
- 2) 5,5-5,7
- 3) 6,5-7,0
- 4) 7,5-8,0
- 5) 8,5-9,0

93. Распространенность кариеса зубов выражается в:

Номер правильного ответа: 2

- 1) абсолютных единицах
- 2) процентах
- 3) относительных единицах
- 4) суммой кариозных, удаленных и пломбированных зубов
- 5) разницей здоровых и пораженных кариесом зубов

94. Интенсивность кариеса зубов выражается:

Номер правильного ответа: 1

- 1) суммой кариозных, пломбированных и удаленных зубов у одного пациента
- 2) отношением суммы кариозных, пломбированных и удаленных к возрасту пациента
- 3) средним показателем суммы кариозных, пломбированных и удаленных зубов в группе обследованных
- 4) отношением количества лиц, имеющих кариозные зубы, к общему числу обследованных, выраженное в процентах
- 5) разницей между индексами КПУ(з) и КПУ(п)

95. Поражаемость кариесом твердых тканей зубов оценивается с помощью индексов:

Номер правильного ответа: 1

- 1) КПУ(з) и КПУ(п)
- 2) ИГР-У
- 3) РНР
- 4) РМА
- 5) СРІТN

96. Электроодонтометрия применяется:

Номер правильного ответа: 1

- 1) для определения состояния нервных окончаний пульпы
- 2) для определения состояния нервных окончаний периодонта
- 3) для определения состояния сосудов
- 4) для выявления дентиклей
- 5) для определения возбудимости нервных окончаний пародонта

97. Наибольшую информацию о состоянии периапикальных тканей зубов верхней и нижней челюсти дает:

Номер правильного ответа: 5

- 1) дентальная рентгенография
- 2) панорамная рентгенография
- 3) ортопантомография
- 4) телерентгенография
- 5) КЛКТ

98. Метод рентгенодиагностики целесообразно использовать для выявления возможности прохождения корневого канала правого верхнего шестого зуба:

Номер правильного ответа: 1

- 1) дентальная рентгенография
- 2) панорамная рентгенография
- 3) ортопантомография

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 4) телерентгенография
- 5) рентгенокинематография

99. Метод рентгенодиагностики наиболее информативен при выявлении соответствия размеров верхней и нижней челюсти:

Номер правильного ответа: 4

- 1) дентальная рентгенография
- 2) панорамная рентгенография
- 3) ортопантомография
- 4) телерентгенография
- 5) рентгенокинематография

100. Метод рентгенодиагностики наиболее информативен для выявления морфологии элементов височно-нижнечелюстного сустава:

Номер правильного ответа: 5

- 1) дентальная рентгенография
- 2) панорамная рентгенография
- 3) ортопантомография
- 4) телерентгенография
- 5) томография

101. Иммунитет это:

Номер правильного ответа: 3

- 1) способность иммунной системы вырабатывать антитела
- 2) способность иммунокомпетентных клеток распознавать чужеродные белки
- 3) способность (механизм) защиты организма от живых тел и веществ, несущих в себе признаки генетически чужеродной информации
- 4) способность некоторых клеток уничтожать бактериальные клетки, попадающие из внешней среды
- 5) фагоцитарная функция клеток организма

102. Факторы неспецифической защиты это:

Номер правильного ответа: 4

- 1) выработка антител к определенному антигену
- 2) физиологическое воздействие на бактериальную клетку
- 3) химическое воздействие на микроорганизм
- 4) комплексное (физиологическое, химическое) воздействие на микроорганизм
- 5) фагоцитарная функция специфических клеток

103. Действие неспецифических механизмов защиты в полости рта проявляется:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сразу же в момент попадания белковой субстанции или иного вещества
- 2) через сутки
- 3) через 1-2 недели
- 4) необходимо время для синтеза иммуноглобулинов
- 5) необходимо время для формирования защиты

104. Наиболее важный фактор неспецифической защиты организма (в полости рта): 1 - барьерная функция тканей полости рта; 2 - слюноотделение; 3 - находящиеся в слюне антибактериальные компоненты лизоцим, и другие; 4 - резидентная микрофлора в полости рта; 5 - иммуноглобулины, лейкоциты. Выберите правильный ответ по схеме:

Номер правильного ответа: 5

- 1) если правильны ответы 1, 2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5

105. Фактор, оказывающий существенное влияние на иммунологический статус человека: 1 - возраст больного; 2 - перенесенные заболевания и их давность; 3 - психологическое состояние

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

больного;4 - условия работы (шум, ионизация, воздействие химических веществ и другие);5 - условия проживания и питания. Выберите правильный ответ по схеме:

Номер правильного ответа: 5

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

106. Специфическая реакция организма на антиген:

Номер правильного ответа: 1

- 1) выработка антитела (специфических иммуноглобулинов)
- 2) развитие гиперчувствительности немедленного или замедленного типа
- 3) иммунологическая память
- 4) иммунологическая толерантность
- 5) отек Квинке

107. Для дисфункции височно-нижнечелюстного сустава характерно:1 - боль в суставе;2 - хруст и щелканье в суставе;3 - смещение нижней челюсти;4 - снижение высоты прикуса;5 - синдром Костена. Выберите правильный ответ по схеме:

Номер правильного ответа: 5

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

108. Нормальная частота пульса взрослого человека в пределах:

Номер правильного ответа: 2

- 1) 40-80 ударов в минуту
- 2) 60-100 ударов в минуту
- 3) 80-120 ударов в минуту
- 4) 90-130 ударов в минуту
- 5) 100-140 ударов в минуту

109. Частота дыхания в минуту взрослого человека находится в пределах:

Номер правильного ответа: 2

- 1) от 10 до 14
- 2) от 14 до 20
- 3) от 16 до 24
- 4) от 24 до 28
- 5) от 26 до 50

110. При обследовании пациента обязательно пальпируется бимануально следующая область:

Номер правильного ответа: 5

- 1) преддверие полости рта
- 2) слизистая оболочка щеки
- 3) контуры губ
- 4) уздечка языка
- 5) дно полости рта

111. При проведении электроодонтодиагностики больного зуба целесообразно начать измерение:

Номер правильного ответа: 4

- 1) сразу с причинного зуба
- 2) с антагониста
- 3) с подобного зуба на противоположной челюсти
- 4) с такого же зуба на противоположной стороне зубной дуги
- 5) с любого другого зуба

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

112. При проведении внешнего осмотра пациента с острым периодонтитом 46 обращают внимание на: 1 состояние кожных покровов; 2 состояние лимфатических узлов; 3 конфигурацию лица; 4 глубину дыхания; 5 состояние жевательных мышц. Выберите правильный ответ по схеме:

Номер правильного ответа: 1

- 1) если правильны ответы 1, 2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5

113. В дифференциальной диагностике пульпита и периодонтита используется: 1 перкуссия зуба; 2 температурная проба; 3 ЭОД; 4 зондирование полости зуба; 5 рентгенография. Выберите правильный ответ по схеме:

Номер правильного ответа: 5

- 1) если правильны ответы 1, 2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5

114. У пациентов с склонностью к кровотечениям предпочтение нужно отдавать следующим видам анестезии:

Номер правильного ответа: 3

- 1) ментальной
- 2) мандибулярной
- 3) подслизистой
- 4) инфраорбитальной
- 5) резцовой

115. Развитию передозировочных реакций на местные анестетики у больных с: кардиологическими заболеваниями способствует: 1. снижение сердечного выброса; 2. уменьшение объема циркулирующей крови; 3. снижение печеночного кровотока; 4. настроение пациентов; 5. уменьшение скорости всасывания анестетика из места инъекции. Выберите правильный ответ по схеме:

Номер правильного ответа: 1

- 1) если правильны ответы 1, 2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5

116. Лечение больных с выраженной сердечной недостаточностью нужно проводить:

Номер правильного ответа: 2

- 1) в горизонтальном положении
- 2) в полугоризонтальном положении
- 3) в вертикальном положении
- 4) в горизонтальном положении с приподнятыми ногами
- 5) не проводить лечение

117. Указание на инфаркт миокарда, перенесенный менее 6 месяцев назад или повторный инфаркт миокарда делает проведение местной анестезии:

Номер правильного ответа: 2

- 1) абсолютно противопоказанным
- 2) показанным по экстренным показаниям, в сочетании с премедикацией
- 3) показанным без ограничений
- 4) показанным с применением вазоконстрикторов
- 5) не проводить лечение

118. У пациентов с гипертензией выше 200/115 стоматологические вмешательства с применением анестетиков:

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

Номер правильного ответа: 4

- 1) проводятся в обычном порядке в условиях поликлиники
- 2) противопоказаны
- 3) проводятся по экстренным показаниям в условиях поликлиники
- 4) неотложные вмешательства проводятся в стационаре
- 5) проводятся в обычном порядке в стационаре

119. Препарат для коррекции психоэмоционального состояния:

Номер правильного ответа: 1

- 1) транквилизаторы
- 2) спазмолитики
- 3) анальгетики
- 4) антигистаминные препараты
- 5) антибиотики

120. Препарат для предупреждения развития нейроциркуляторой дистонии по гипотоническому типу при проведении премедикации:

Номер правильного ответа: 2

- 1) транквилизаторы
- 2) м - холинолитики
- 3) анальгетики
- 4) антигистаминные препараты
- 5) антибиотики

121. Для купирования (торможения) аллергических реакций при проведении премедикации применяют:

Номер правильного ответа: 4

- 1) транквилизаторы
- 2) спазмолитики
- 3) ненаркотические анальгетики
- 4) антигистаминные препараты
- 5) антибиотики

122. Признаки, выявленные при обследовании пациента (потеря сознания; бледные, влажные кожные покровы; гипотония; редкое, поверхностное дыхание) характерны для:

Номер правильного ответа: 2

- 1) эпилепсии
- 2) обморока
- 3) анафилактического шока
- 4) гипогликемии
- 5) коллапса

123. Среди причин возникновения обморока нехарактерной является:

Номер правильного ответа: 4

- 1) психогенная реакция
- 2) болевое раздражение
- 3) гипервентиляция
- 4) нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу
- 5) потеря воды и натрия вследствие рвоты и поноса

124. Патогенетическая терапия коллапса предполагает:

Номер правильного ответа: 5

- 1) урежение частоты сердечных сокращений
- 2) уменьшение объема циркулирующей крови
- 3) понижение тонуса сосудов
- 4) снижение сократительной способности миокарда
- 5) сужение периферических сосудов

125. Горизонтальное положение оптимально при:

Номер правильного ответа: 4

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 1) гипервентиляции
- 2) асфиксии
- 3) гипергликемии
- 4) коллапсе
- 5) приступе бронхиальной астмы

126. Маловероятной Причиной возникновения гипертонического криза является:

Номер правильного ответа: 5

- 1) гипертоническая болезнь
- 2) поражения почек
- 3) поражение ЦНС
- 4) поражение системы крови
- 5) нарушение функции ангиоцицептивной системы

127. У пациента наблюдается быстрое повышение АД, резкая головная боль, рвота, дрожь во всем теле, тахикардия. Имеет место:

Номер правильного ответа: 4

- 1) приступ стенокардии
- 2) коллапс
- 3) гипогликемия
- 4) гипертонический криз
- 5) инфаркт миокарда

128. Длительность приступа стенокардии составляет:

Номер правильного ответа: 2

- 1) 10 -30 секунд
- 2) 30 - 60 секунд
- 3) 1 - 5 минут
- 4) 5 - 10 минут
- 5) 10 - 15 минут

129. Обследование пациента начинают с применения методов:

Номер правильного ответа: 4

- 1) рентгенологических
- 2) лабораторных
- 3) термометрических
- 4) основных
- 5) цитологических

130. Опрос пациента начинается с выяснения:

Номер правильного ответа: 4

- 1) истории жизни
- 2) анамнеза заболевания
- 3) перенесенных заболеваний
- 4) жалоб
- 5) аллергоанамнеза

131. При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть:

Номер правильного ответа: 4

- 1) отклонена назад
- 2) отклонена влево
- 3) отклонена вправо
- 4) наклонена вперед
- 5) отклонена назад и влево

132. Вазоконстрикторы вызывают:

Номер правильного ответа: 2

- 1) расширение сосудов
- 2) сужение сосудов
- 3) гиперемиию кожных покровов

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 4) парестезии
- 5) анальгезию

133. Во время коллапса кожные покровы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сухие, бледные
- 2) влажные, бледные
- 3) сухие, гиперемированные
- 4) влажные, гиперемированные
- 5) нормальные

134. С возникновением гиперплазии десны связаны такие факторы, как:

Номер правильного ответа: 5

- 1) прием противосудорожных препаратов
- 2) беременность
- 3) лейкопения
- 4) ротовое дыхание
- 5) все перечисленное

135. Противопоказания для проведения местной анестезии на амбулаторном стоматологическом приеме:

Номер правильного ответа: 2

- 1) наличие сопутствующего заболевания - сахарный диабет
- 2) непереносимость местного анестетика
- 3) возраст старше 50-ти лет
- 4) наличие сопутствующего заболевания - гипертоническая болезнь (систолическое давление крови более 160мм рт ст)
- 5) разлитой гнойный очаг в мягких тканях лица

136. Целевым пунктом туберальной анестезии является:

Номер правильного ответа: 4

- 1) подглазничный нерв
- 2) передние верхние альвеолярные нервы
- 3) средние верхние альвеолярные нервы
- 4) задние верхние альвеолярные нервы
- 5) тройничный узел

137. Клиническая смерть диагностируется по следующим признакам:

Номер правильного ответа: 1

- 1) Отсутствие сознания, отсутствие дыхания
- 2) Отсутствие пульса на сонной артерии, отсутствие дыхания.
- 3) Отсутствие артериального давления, широкий зрачок, не реагирующий на свет
- 4) Наличие трупных пятен, наличие широкого зрачка не реагирующего на свет
- 5) Синюшность кожных покровов, отсутствие сердцебиения

138. Пациентам группы риска показано использование местноанестезирующего средства, не влияющего на тонус сосуда

Номер правильного ответа: 1

- 1) Мепивакаин
- 2) Новокаин
- 3) Лидокаин
- 4) Артикаин
- 5) Ансетезин

139. Электровозбудимость пульпы при воспалении

Номер правильного ответа: 3

- 1) Возрастает
- 2) Остается без изменений
- 3) Снижается
- 4) Колеблется

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

5) Не определяется

140. Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта:

Номер правильного ответа: 3

- 1) подкожная
- 2) интубационная
- 3) интралигаментарная
- 4) эпидуральная
- 5) внутривенная

141. Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва:

Номер правильного ответа: 4

- 1) кожа и слизистая щеки
- 2) альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти
- 3) альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 4) бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 5) слизистая неба

142. Эффективность профилактики при использовании метода герметизации фиссур составляет (%):

Номер правильного ответа: 5

- 1) 20
- 2) 40
- 3) 60
- 4) 80
- 5) Более 95

143. Степень поражения эмали при очаговой деминерализации можно оценить с помощью:

Номер правильного ответа: 3

- 1) зондирования
- 2) электроодонтодиагностики
- 3) витального окрашивания эмали
- 4) рентгенологического исследования
- 5) определения индекса Грин-Вермиллиона

144. Основным местным фактором риска возникновения катарального гингивита является:

Номер правильного ответа: 2

- 1) наследственность
- 2) наличие микробного налета
- 3) вредные привычки
- 4) подвижность зубов
- 5) наличие эндокринной патологии

145. Профилактике воспалительных заболеваний пародонта в большей мере способствует:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прием фторидсодержащих препаратов
- 2) проведение профессиональной гигиены
- 3) реминерализующая терапия
- 4) уменьшение употребления углеводов
- 5) прием витаминов

146. У какого условного анатомического образования корневого канала необходимо создать апикальный упор?

Номер правильного ответа: 3

- 1) у биологического апекса
- 2) у рентгенологического апекса
- 3) у апикальной констрикции

147. С какой части канала начинается физиологическая облитерация каналов:

Номер правильного ответа: 1

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Первая категория.

- 1) устьевой
- 2) апикальной

148. 17% р-р ЭДТА:

Номер правильного ответа: 2

- 1) хорошо работает вместе с р-ром гипохлорита натрия, нуждается в активации, смене через 20 сек.
- 2) вспенивается и нейтрализуется при применении вместе с р-ром гипохлорита натрия, не нуждается в активации, требует времени для работы в течение 1 минуты

149. После перенесенного инфаркта миокарда плановое стоматологическое лечение можно проводиться в амбулаторных условиях

Номер правильного ответа: 4

- 1) Нет ограничений по времени
- 2) Через месяц
- 3) Через 3 месяца
- 4) 6 месяцев
- 5) Через 1 Год

150. Травматическую язву дифференцируют с

Номер правильного ответа: 1

- 1) раковой язвой
- 2) аллергическим стоматитом
- 3) многоформной экссудативной эритемой
- 4) глоссалгией
- 5) острым герпетическим стоматитом