

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

1. Обследование пациента начинают с применения методов:

Номер правильного ответа: 4

- 1) рентгенологических
- 2) лабораторных
- 3) термометрических
- 4) основных
- 5) цитологических

2. Опрос пациента начинается с выяснения:

Номер правильного ответа: 4

- 1) истории жизни
- 2) анамнеза заболевания
- 3) перенесенных заболеваний
- 4) жалоб
- 5) аллергоанамнеза

3. При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть

Номер правильного ответа: 4

- 1) отклонена назад
- 2) отклонена влево
- 3) отклонена вправо
- 4) наклонена вперед
- 5) отклонена назад и влево

4. Вазоконстрикторы вызывают:

Номер правильного ответа: 2

- 1) расширение сосудов
- 2) сужение сосудов
- 3) гиперемия кожных покровов
- 4) парестезии
- 5) анальгезию

5. Во время коллапса кожные покровы:

Номер правильного ответа: 2

- 1) сухие, бледные
- 2) влажные, бледные
- 3) сухие, гиперемированные
- 4) влажные, гиперемированные
- 5) нормальные

6. С возникновением гиперплазии десны связаны такие факторы, как

Номер правильного ответа: 5

- 1) прием противосудорожных препаратов
- 2) беременность
- 3) лейкомия
- 4) ротовое дыхание
- 5) все перечисленное

7. Противопоказания для проведения местной анестезии на амбулаторном стоматологическом приеме

Номер правильного ответа: 2

- 1) наличие сопутствующего заболевания - сахарный диабет
- 2) непереносимость местного анестетика
- 3) возраст старше 50-ти лет
- 4) наличие сопутствующего заболевания - гипертоническая болезнь (систолическое давление крови более 160мм рт ст)
- 5) разлитой гнойный очаг в мягких тканях лица

8. Целевым пунктом туберальной анестезии является

Номер правильного ответа: 4

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

- 1) подглазничный нерв
- 2) передние верхние альвеолярные нервы
- 3) средние верхние альвеолярные нервы
- 4) задние верхние альвеолярные нервы
- 5) тройничный узел

9. Клиническая смерть диагностируется по следующим признакам:

Номер правильного ответа: 1

- 1) Отсутствие сознания, отсутствие дыхания
- 2) Отсутствие пульса на сонной артерии, отсутствие дыхания
- 3) Отсутствие артериального давления, широкий зрачок, не реагирующий на свет
- 4) Наличие трупных пятен, наличие широкого зрачка не реагирующего на свет
- 5) Синюшность кожных покровов, отсутствие сердцебиения

10. Пациентам группы риска показано использование местноанестезирующего средства не влияющего на тонус сосуда

Номер правильного ответа: 1

- 1) Мепивакаин
- 2) Новокаин
- 3) Лидокаин
- 4) Артикаин
- 5) Анесетезин

11. Электровозбудимость пульпы при воспалении

Номер правильного ответа: 3

- 1) Возрастает
- 2) Остается без изменений
- 3) Снижается
- 4) Колеблется
- 5) Не определяется

12. Вид инфильтрационной анестезии, используемой в полости рта

Номер правильного ответа: 3

- 1) подкожная
- 2) интубационная
- 3) интралигаментарная
- 4) эпидуральная
- 5) внутривенная

13. Зона иннервации задних верхних альвеолярных ветвей верхнечелюстного нерва

Номер правильного ответа: 4

- 1) кожа и слизистая щеки
- 2) альвеолярный отросток и моляры нижней челюсти
- 3) альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 4) бугор, альвеолярный отросток и моляры верхней челюсти
- 5) слизистая неба

14. Эффективность профилактики при использовании метода герметизации фиссур составляет (%):

Номер правильного ответа: 5

- 1) 20
- 2) 40
- 3) 60
- 4) 80
- 5) Более 95

15. Степень поражения эмали при очаговой деминерализации можно оценить с помощью

Номер правильного ответа: 3

- 1) зондирования
- 2) электроодонтодиагностики
- 3) витального окрашивания эмали

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

- 4) рентгенологического исследования
- 5) определения индекса Грин-Вермиллиона

16. Основным местным фактором риска возникновения катарального гингивита является
Номер правильного ответа: 2

- 1) наследственность
- 2) наличие микробного налета
- 3) вредные привычки
- 4) подвижность зубов
- 5) наличие эндокринной патологии

17. Профилактике воспалительных заболеваний пародонта в большей мере способствует
Номер правильного ответа: 2

- 1) прием фторидсодержащих препаратов
- 2) проведение профессиональной гигиены
- 3) реминерализирующая терапия
- 4) уменьшение употребления углеводов
- 5) прием витаминов

18. У какого условного анатомического образования корневого канала необходимо создать апикальный упор?

Номер правильного ответа: 3

- 1) у биологического апекса
- 2) у рентгенологического апекса
- 3) у апикальной констрикции

19. С какой части канала начинается физиологическая облитерация каналов

Номер правильного ответа: 1

- 1) устьевой
- 2) апикальной

20. 17% р-р ЭДТА

Номер правильного ответа: 2

- 1) хорошо работает вместе с р-ром гипохлорита натрия, нуждается в активации, смене через 20 сек
- 2) вспенивается и нейтрализуется при применении вместе с р-ром гипохлорита натрия, не нуждается в активации, требует времени для работы в течение 1 минуты

21. После перенесенного инфаркта миокарда плановое стоматологическое лечение можно проводиться в амбулаторных условиях

Номер правильного ответа: 4

- 1) Нет ограничений по времени
- 2) Через месяц
- 3) Через 3 месяца
- 4) 6 месяцев
- 5) Через 1 Год

22. Травматическую язву дифференцируют с

Номер правильного ответа: 1

- 1) раковой язвой
- 2) аллергическим стоматитом
- 3) многоформной экссудативной эритемой
- 4) глоссалгией
- 5) острым герпетическим стоматитом

23. Дифференциальные признаки отличия клиновидных дефектов от эрозии эмали зубов

Номер правильного ответа: 2

- 1) дефекты располагаются на различных поверхностях зубов, матовые, с размягченным дентином
- 2) дефекты располагаются в области шеек зубов, имеют специфическую форму, гладкие, блестящие, крепитируют при зондировании

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

- 3) дефекты различной формы, располагаются несколько ниже экватора зуба, с плотным дном, наличие гиперестезии дентина
- 4) дефекты расположены в области шеек зубов, виден размягченный дентин, крепитация и пигментация отсутствуют
- 5) дефекты бороздчатой формы расположены в области экватора зуба, с плотным дном, без гиперестезии дентина

24. Начальный кариес характеризуется появлением:

Номер правильного ответа: 1

- 1) меловидного пятна на поверхности эмали
- 2) эрозии эмали
- 3) полости в пределах эмали
- 4) полости в пределах дентина
- 5) кровоточивости десен

25. Назовите признаки очага малигнизации лейкоплакии

Номер правильного ответа: 5

- 1) усиление процессов ороговения, быстрое увеличение размеров и плотности очага
- 2) появление уплотнения в основании бляшки, эрозии
- 3) сосочковые разрастания на поверхности эрозий
- 4) кровоточивость при травме, появление незаживающих трещин
- 5) все вышеперечисленное

26. После заживления афты останется

Номер правильного ответа: 4

- 1) рубец гладкий
- 2) деформирующий рубец
- 3) рубцовая атрофия
- 4) слизистая оболочка останется без изменений
- 5) все вышеперечисленное

27. Пародонтит протекает более тяжело, если у пациента

Номер правильного ответа: 1

- 1) сахарный диабет
- 2) гипотиреоз
- 3) гипертония
- 4) язвенная болезнь
- 5) гастрит

28. В течение какого времени должно вестись наблюдение за зубом после эндодонтического лечения

Номер правильного ответа: 3

- 1) 1 месяц
- 2) 1 месяц, 3 месяца, полгода, год
- 3) 6 месяцев, 12 месяцев, 24 месяца, 4 года
- 4) 3 месяца, 6 месяцев

29. В ближайшие месяцы после качественной эндодонтии деструктивные процессы в очаге воспаления могут

Номер правильного ответа: 1

- 1) расти из-за активности макрофагов
- 2) не изменяться из-за активности макрофагов
- 3) уменьшаться из-за активности макрофагов

30. В какой период стоматологического вмешательства чаще всего возникают осложнения соматического характера

Номер правильного ответа: 3

- 1) Во время проведения диагностики
- 2) Во время лечения
- 3) Во время проведения инъекции

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

4) Через несколько дней после лечения

31. Выключение язычного нерва осуществляется при анестезии

Номер правильного ответа: 1

- 1) торусальной
- 2) туберальной
- 3) ментальной
- 4) инфраорбитальной
- 5) палатинальной

32. При создании «ковровой дорожки» до какого условного анатомического ориентира должны доходить инструменты

Номер правильного ответа: 4

- 1) до середины канала
- 2) до биологического апекса
- 3) до анатомического апекса
- 4) до апикальной констрикции

33. Какие профилактические меры должен предпринять стоматолог при наличии в анамнезе у пациента сахарного диабета

Номер правильного ответа: 3

- 1) Никакие
- 2) Проветрить кабинет, провести влажную уборку
- 3) Измерить уровень глюкозы в крови пациента
- 4) Тщательно собрать общесоматический анамнез

34. Гипоплазия твердых тканей зубов

Номер правильного ответа: 1

- 1) порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей
- 2) эндемическое заболевание, обусловленное интоксикацией фтором при избыточном содержании его в питьевой воде
- 3) сращение, слияние и раздвоение зубов
- 4) нарушение эмалеобразования, выражающиеся системным нарушением структуры и минерализации молочных и постоянных зубов
- 5) прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этиологии

35. В каких случаях при остром апикальном периодонтите можно оставить зуб открытым

Номер правильного ответа: 4

- 1) если из зуба течет гной
- 2) если из зуба течет кровь
- 3) если из зуба течет прозрачная жидкость
- 4) ни в каких
- 5) во всех

36. Какую пробу можно выполнить перед лечением для определения непереносимости анестетиков

Номер правильного ответа: 5

- 1) накожную
- 2) внутрикожную
- 3) подкожную
- 4) внутриротовую (ополаскивание)
- 5) никакую

37. К реминерализующим средствам относится раствор

Номер правильного ответа: 4

- 1) перекиси водорода 10%
- 2) эуфиллина 2,4%
- 3) метиленового синего 2%
- 4) фторида натрия 2%
- 5) гипохлорита натрия 1%

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

38. В какой форме ультракаина содержится в два раза больше адреналина

Номер правильного ответа: 3

- 1) ультракаин Д-С
- 2) ультракаин А
- 3) ультракаин Д-С форте
- 4) ультракаин Д
- 5) ультракаин Е

39. При возникновении гипогликемического состояния пациенту необходимо

Номер правильного ответа: 3

- 1) Прием сладкого чая
- 2) Введение инсулина
- 3) Введение глюкозы внутривенно 40%
- 4) Введение адреналина
- 5) Введение физраствора. Внутривенно струйно

40. Влияет ли применение МТА на изменение цвета твердых тканей зуба

Номер правильного ответа: 1

- 1) влияет
- 2) не влияет

41. Как обеспечить проходимость верхних дыхательных путей

Номер правильного ответа: 2

- 1) Проведение искусственной вентиляции легких
- 2) Рефлекторный кашель, прием Геймлиха, коникотомия
- 3) Коникотомия
- 4) Прием Геймлиха

42. Патологический процесс твердых тканей зубов, развивающийся после из прорезывания, при котором происходят деминерализация и протеолиз с последующим образованием дефекта под воздействием внешних и внутренних факторов – это

Номер правильного ответа: 1

- 1) кариес
- 2) эрозия
- 3) истирание
- 4) гипоплазия
- 5) флюороз

43. К основным методам обследования относятся

Номер правильного ответа: 2

- 1) опрос, рентгенография
- 2) опрос, осмотр
- 3) осмотр, ЭОД
- 4) ЭОД, рентгенография
- 5) перкуссия, ЭОД

44. Слизистая оболочка полости рта в норме

Номер правильного ответа: 3

- 1) бледного цвета, сухая
- 2) бледно-розового цвета, сухая
- 3) бледно-розового цвета, равномерно увлажнена
- 4) ярко-красного цвета, обильно увлажнена
- 5) гиперемирована, отечна

45. Какой из перечисленных препаратов необходимо активировать и менять в канале каждые 20 сек

Номер правильного ответа: 1

- 1) р-р гипохлорита натрия
- 2) ЭДТА
- 3) р-р хлоргексидина
- 4) никакой

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

5) все

46. Потеря сознания, гиперемия кожных покровов, частый пульс малого наполнения, снижение АД, удушье, расширение зрачков являются характерными признаками

Номер правильного ответа: 1

- 1) анафилактического шока
- 2) кардиогенного шока
- 3) Инсульта
- 4) сердечной астмы
- 5) Обморока
- 6) Клинической смерти

47. Указать ошибки при препарировании кариозной полости

Номер правильного ответа: 2

- 1) Нависающий край пломбы
- 2) Термический ожог пульпы зуба, вскрытие полости зуба
- 3) Химический ожог пульпы зуба
- 4) Хроническое воспаление десневого края
- 5) Отсутствие контактного пункта

48. Для облегчения прохождения корневого канала используют

Номер правильного ответа: 4

- 1) крезофен
- 2) паркан
- 3) Пульперил
- 4) ЭДТА
- 5) гидроокись кальция

49. При отверждении химического композита полимеризационная усадка происходит в направлении

Номер правильного ответа: 1

- 1) Центра
- 2) протравленной эмали
- 3) источника света
- 4) периферии
- 5) дна кариозной полости

50. Что допустимо при селективном перелечивании

Номер правильного ответа: 1

- 1) Перелечить один корень из трех
- 2) Перелечить один канал из двух в одном корне

51. Что надо сделать, если через 1 месяц после эндодонтического лечения временная пломба выпала, а пациент обратился за помощью через 3 месяца

Номер правильного ответа: 2

- 1) удалить зуб
- 2) повторить эндодонтическое лечение
- 3) немедленно начать ортопедическое лечение

52. Подъязычный нерв иннервирует

Номер правильного ответа: 3

- 1) зубы верхней челюсти
- 2) слизистую оболочку неба
- 3) слизистую оболочку десны с язычной стороны
- 4) нижнюю губу и кожу подбородочной области
- 5) слизистую щеки

53. Назовите местный анестетик, который наиболее хорошо проникает в зону воспаления

Номер правильного ответа: 3

- 1) Мепивакаин

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

- 2) Лидокаин
- 3) Артикаин
- 4) Убистезин™

54. Наиболее частой причиной возникновения местной гипоплазии постоянного зуба является
Номер правильного ответа: 4

- 1) наследственность
- 2) заболевания матери в период беременности
- 3) заболевания ребенка на первом году жизни
- 4) хронический периодонтит временного моляра
- 5) неудовлетворительная гигиена полости рта

55. Выполнить экстренную коникотомию обязан врач стоматолог какой специализации
Номер правильного ответа: 1

- 1) Любой
- 2) Стоматолог хирург
- 3) Стоматолог ортопед
- 4) Стоматолог терапевт

56. Пациентам с воспалительными заболеваниями пародонта в стадии обострения рекомендуют
пользоваться зубной щеткой

Номер правильного ответа: 1

- 1) мягкой
- 2) средней жесткости
- 3) жесткой
- 4) очень жесткой
- 5) чистка зубов не требуется

57. В течении острого герпетического стоматита выделяют следующие периоды

Номер правильного ответа: 5

- 1) катаральный, период высыпаний, продромальный, выздоровления
- 2) период высыпаний, период активных проявлений, продромальный, клинического выздоровления
- 3) инкубационный, период высыпаний, период угасания, период реабилитации
- 4) период высыпаний, угасания и клинического выздоровления
- 5) инкубационный, продромальный, период высыпаний, период угасания и клинического выздоровления

58. Какие инструменты рекомендовано применять при обработке корневого канала до 20 размера

Номер правильного ответа: 1

- 1) стальные
- 2) никель-титановые

59. Сколько по времени необходимо проводить сердечно-легочную реанимацию

Номер правильного ответа: 3

- 1) 10 минут
- 2) 30 минут
- 3) До приезда бригады скорой помощи
- 4) Пока есть силы у людей оказывающих неотложную помощь

60. Деонтология – это

Номер правильного ответа: 1

- 1) учение о долге одного человека перед другим и обществом в целом
- 2) учение о морали
- 3) учение о взаимоотношениях врача и больного

61. Наиболее частой причиной инфаркта миокарда у лиц молодого возраста является

Номер правильного ответа: 5

- 1) тромбоз коронарных артерий
- 2) эмболия
- 3) васкулит

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

- 4) атеросклероз
- 5) длительный спазм коронарных артерий

62. Тахикардия, нарушение ритма, одышка, боль за грудиной с иррадиацией, неэффективность неоднократного приема нитроглицерина свидетельствуют в пользу

Номер правильного ответа: 4

- 1) пароксизмальной тахикардии
- 2) стенокардии напряжения
- 3) стенокардии покоя
- 4) инфаркта миокарда
- 5) коллапса

63. Фазы большого эпилептического припадка: 1. аура; 2. фаза тонических судорог; 3. фаза клонических судорог; 4. беспричинный смех; 5. беспокойство. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 1

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

64. Употреблением стакана сахаросодержащих напитков можно купировать

Номер правильного ответа: 4

- 1) обморок
- 2) коллапс
- 3) гипергликемию
- 4) гипогликемию
- 5) анафилактический шок

65. Для клинической картины гипогликемии нехарактерен симптом

Номер правильного ответа: 5

- 1) чувства голода
- 2) общей слабости
- 3) влажность кожных покровов
- 4) тремора пальцев
- 5) спутанность сознания, вплоть до его потери

66. Для гипогликемии характерен симптом

Номер правильного ответа: 1

- 1) снижение глюкозы крови
- 2) запах ацетона изо рта
- 3) глубокое, шумное дыхание
- 4) снижение мышечного тонуса
- 5) ацетонурия

67. Для гипергликемии характерен симптом

Номер правильного ответа: 4

- 1) снижение глюкозы крови
- 2) запах ацетона изо рта
- 3) поверхностное дыхание
- 4) диплопия
- 5) ацетонурия

68. Выраженный цианоз, резкая одышка, отсутствие двигательной активности, участие дополнительных мышц в акте дыхания, вздутие шейных вен, выбухание надключичных ямок характеризуют

Номер правильного ответа: 2

- 1) асфиксию обтурационную
- 2) приступ бронхиальной астмы

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

- 3) большой эпилептический припадок
- 4) приступ стенокардии
- 5) гипервентиляцию

69. Какие лекарства реже других могут вызвать анафилаксию

Номер правильного ответа: 5

- 1) местнообезболивающие
- 2) антибиотики
- 3) витамины
- 4) органические препараты
- 5) вазоконстрикторы

70. Наиболее вероятно анафилаксия в отношении

Номер правильного ответа: 3

- 1) гормонов
- 2) наркотических анальгетиков
- 3) препаратов йода
- 4) транквилизаторов
- 5) витаминов

71. Доминирующим симптомом системной анафилаксии является

Номер правильного ответа: 3

- 1) диссеминированное внутрисосудистое свертывание
- 2) кардиогенный шок
- 3) гипертонический криз
- 4) сосудистый коллапс
- 5) судороги

72. Острое нарушение внешнего дыхания характеризуется: 1. цианозом; 2. выраженной тахикардией; 3. ортопноэ; 4. одышкой; 5. palpitations в сердце. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 1

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

73. Тремя признаками, достаточными для диагностики состояния клинической смерти, являются: 1. апноэ; 2. асистолия; 3. арефлексия; 4. широкий зрачок; 5. отсутствие роговичного рефлекса. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 1

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

74. При неэффективности приемов, способствующих удалению инородных тел из дыхательных путей, производят

Номер правильного ответа: 3

- 1) трахеотомию
- 2) трахеостомию
- 3) коникотомию
- 4) цистотомию
- 5) остеотомию

75. Уровень резистентности организма к кариозному процессу снижают

Номер правильного ответа: 2

- 1) зубные отложения

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

- 2) различные общие заболевания, связанные с нарушением регуляции обменных процессов в организме
3) углеводы пищи
4) недостаточное содержание фтора в питьевой воде
5) все вышеперечисленное

76. Для клиновидного дефекта характерно

Номер правильного ответа: 5

- 1) появление после прорезывания зубов
2) локализация в пришеечной области
3) характерная форма клина
4) редкое развитие гиперестезии
5) все выше перечисленное

77. Для лечения гиперестезии твердых тканей зубов применяют: 1. 3% раствор дикаина, жидкость Платонова; 2. глубокое фторирование; 3. препараты серебра; 4. десенситайзеры (Seal and Protect, Gluma Desensitizer); 5. фторлак. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 3

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
2) если правильны ответы 1 и 2
3) если правильны ответы 2 и 4
4) если правильный ответ 4
5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

78. При общем лечении постлучевого некроза твердых тканей зубов применяют: 1. антиоксиданты; 2. препараты кальция и поливитамины; 3. гормональные препараты; 4. анестетики; 5. десенсибилизирующие препараты. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 2

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
2) если правильны ответы 1 и 2
3) если правильны ответы 2 и 4
4) если правильный ответ 4
5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

79. При препарировании кариозной полости скос эмали (фальц) формируется

Номер правильного ответа: 5

- 1) всегда
2) не формируется в полостях 3 класса
3) не формируется в полостях 5 класса
4) не формируется никогда
5) не формируется на окклюзионной поверхности

80. К компомерам относится

Номер правильного ответа: 5

- 1) Evicrol
2) Herculite XRV
3) Revolution
4) Dyract AP
5) Vitremer

81. Положительными свойствами микрофилов являются

Номер правильного ответа: 5

- 1) хорошая полируемость и стойкость глянцевой поверхности
2) высокая цветостабильность
3) эластичность
4) низкий абразивный износ
5) все выше перечисленное

82. Отрицательными свойствами микрогибридных композитов являются

Номер правильного ответа: 5

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

- 1) не идеальное качество поверхности (хуже, чем у микрофилов)
- 2) сложность клинического применения
- 3) недостаточная прочность и пространственная стабильность при пломбировании обширных дефектов 2 и 4 классов
- 4) трудоемкость моделирования пломбы и заполнения материалом ретенционных углублений и придесневой стенки
- 5) все выше перечисленное

83. Наиболее ценным качеством текучих композитов является

Номер правильного ответа: 3

- 1) высокая прочность
- 2) отличные эстетические характеристики
- 3) высокая эластичность, тиксотропность
- 4) низкая полимеризационная усадка
- 5) высокая пространственная стабильность

84. К текучим композитам относятся: 1. FiltekFlow; 2. Sure Fill; 3. Flow Line; 4. Tetric Ceram; 5. Durafil. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 2

- 1) если правильны ответы 1, 2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 2
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5

85. Выберите материал, относящийся к группе СИЦ двойного отверждения

Номер правильного ответа: 3

- 1) Silux Plus
- 2) Vitremer
- 3) Time Line
- 4) Revolution
- 5) Dyract Flou

86. При реставрации дефектов 5 класса предпочтительно использование

Номер правильного ответа: 4

- 1) амальгамы
- 2) традиционных микрогибридов
- 3) стеклоиономерных цементов
- 4) текучих композитов и компомеров, микрофилов
- 5) макрофилов

87. При пломбировании полостей 3-4 классов линейная прокладка ставится

Номер правильного ответа: 4

- 1) из фосфатцемента
- 2) компомера
- 3) традиционного СИЦ
- 4) гибридного СИЦ двойного отверждения
- 5) не имеет значения

88. Исход лечения начального кариеса считается успешным

Номер правильного ответа: 5

- 1) пигментация пятна
- 2) уменьшение размеров пятна
- 3) ослабление прокрашиваемости пятна
- 4) исчезновение пятна
- 5) любой из указанных

89. Профилактику кариеса зубов необходимо осуществлять

Номер правильного ответа: 5

- 1) в детском возрасте

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

- 2) у подростков
- 3) у беременных
- 4) у взрослых
- 5) на протяжении всей жизни человека

90. После лечения кариеса зубов могут возникать: 1. осложнения воспаление и некроз пульпы; 2. вторичный кариес; 3. папиллит; 4. травматический верхушечный периодонтит; 5. нарушение окклюзии. Выберите правильный ответ по схеме

Номер правильного ответа: 5

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 2
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

91. Решающим в дифференциальной диагностике глубокого кариеса и хронического фиброзного пульпита является

Номер правильного ответа: 2

- 1) характер болей
- 2) термометрия
- 3) зондирование
- 4) электроодонтометрия
- 5) фактор времени

92. Клеточный состав пульпы следующий

Номер правильного ответа: 2

- 1) пульпа как соединительная ткань богата присущими ей клетками
- 2) кроме клеток, присущих соединительной ткани и специфических клеток, пульпа содержит малодифференцированные, звездчатые клетки
- 3) клеточный состав пульпы представлен клетками плазмочитарного и макрофагального рядов
- 4) близки по составу к эпителиальной ткани
- 5) похожа на нервную ткань

93. В строении корневой и коронковой пульпы имеются различия

Номер правильного ответа: 2

- 1) нет, ибо корневая -пульпа является непрерывным продолжением коронковой
- 2) корневая пульпа значительно отличается от коронковой по строению, ибо она является промежуточной между коронковой пульпой и периодонтитом
- 3) корневая пульпа незначительно отличается от коронковой, по строению она ближе к ней, чем к периодонту
- 4) корневая пульпа близка к ткани периодонта
- 5) коронковая пульпа близка к нервной ткани

94. В строении коронковой и корневой пульпы отличия состоят

Номер правильного ответа: 3

- 1) в особенностях строения волокон соединительной ткани в этих зонах
- 2) в особенности васкуляризации
- 3) в соотношении волокон, клеток и межучного вещества
- 4) в особенностях строения соединительной ткани, ее кровоснабжения и иннервации
- 5) корневая пульпа близка к тканям: периодонтита

95. Основная функция пульпы

Номер правильного ответа: 3

- 1) трофическая, ибо через пульпу осуществляется обмен в твердых тканях зуба
- 2) пластическая — способность воссоздавать элементы соединительной ткани и заместительной дентин
- 3) защитная — способность сопротивляться раздражающему агенту
- 4) пульпа индифферентна по отношению к твердым тканям
- 5) пульпа безвредна для твердых тканей

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

96. Защитная функция пульпы определяется

Номер правильного ответа: 3

- 1) деятельностью клеток фибробластического ряда, способных ограничивать воспалительный процесс
- 2) фагоцитарной активностью клеток
- 3) способностью одонтобластов вырабатывать заместительный дентин
- 4) волокнистыми структурами, способными выравнять рН пульпы
- 5) тканевым иммунитетом, который определяется совместной деятельностью вышеперечисленных тканевых элементов, а также нейро-рефлекторной и гуморальной регуляцией организма

97. Решающим при диагностике острого пульпита является

Номер правильного ответа: 5

- 1) характер болей
- 2) термометрия
- 3) электрометрия
- 4) перкуссия
- 5) фактор времени и первичность болей

98. Из предложенных методов лечения наиболее рационально применять при остром пульпите

Номер правильного ответа: 4

- 1) девитализацию пульпы
- 2) сохранение жизнеспособности всей пульпы
- 3) витальную ампутацию
- 4) витальную экстирпацию
- 5) удаление зуба

99. При хроническом пульпите лучше всего применить

Номер правильного ответа: 3

- 1) сохранение жизнеспособности всей пульпы
- 2) витальную ампутацию
- 3) витальную экстирпацию
- 4) девитализацию
- 5) удаление зуба

100. При биологических методах лечения пульпита возникающие осложнения связаны

Номер правильного ответа: 1

- 1) с ошибками в диагнозе
- 2) с неправильным выбором лекарственного препарата
- 3) с плохой фиксацией пломбы
- 4) с нарушением правил асептики
- 5) с ошибками в технике проведения метода

101. Большой процент несовпадений клинического и гистологического диагнозов пульпита объясняется

Номер правильного ответа: 1

- 1) несовершенством методов диагностики пульпитов
- 2) поздним обращением больных
- 3) особенностью клинического течения, выражающегося в закрытой полости зуба
- 4) гиперэргическим характером воспаления
- 5) не назван

102. Основные свойства коллагеновых волокон периодонта

Номер правильного ответа: 1

- 1) удерживают зуб в правильном положении, равномерно распределяя давление на стенки
- 2) способны набухать в кислой среде, окрашивая ее
- 3) создают благоприятные условия для фагоцитоза при воспалении
- 4) обеспечивают физиологическую подвижность зуба
- 5) устойчивы к переваривающему действию тканевых ферментов и играют большое значение в репаративных процессах.

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

103. Решающим тестом в дифференциальной диагностике острого периодонтита и пульпита являются

Номер правильного ответа: 1

- 1) перкуссия
- 2) электроодонтодиагностика, термометрия
- 3) характер болей
- 4) термометрия
- 5) рентгенодиагностика

104. Наибольшие трудности для достижения верхушечного отверстия и подготовки к пломбированию 16 или 26 зуба представляет

Номер правильного ответа: 2

- 1) дистальный небный
- 2) медиальный щечный
- 3) щечный
- 4) дистальный щечный
- 5) небный

105. Принятая рабочая длина корневого канала

Номер правильного ответа: 2

- 1) точно соответствует анатомической длине зуба
- 2) короче на 1 мм, чем анатомическая длина зуба
- 3) длиннее на 1 мм, чем анатомическая длина зуба
- 4) иногда равна длине глубиномера (по субъективным ощущениям)
- 5) всегда равна длине глубиномера (по субъективным ощущениям)

106. Корневая пломба должна

Номер правильного ответа: 4

- 1) достигать верхушечной трети канала
- 2) достигать верхушечного отверстия по рентгенологической оценке
- 3) быть на 1-2 мм дальше верхушечного отверстия
- 4) располагать на 1 мм до верхушечного отверстия по рентгено-логической оценке
- 5) достигать уровня дентино-цементного соединения

107. Чаще всего бессимптомны

Номер правильного ответа: 4

- 1) острый пульпит
- 2) хронический открытый пульпит
- 3) хронический закрытый пульпит
- 4) дентикл
- 5) полип пульпы

108. Согласно общему плану лечения, лечебные мероприятия (кроме неотложных случаев) нужно начинать с

Номер правильного ответа: 3

- 1) выявления кариеса
- 2) лечение заболеваний пародонта
- 3) профессиональная гигиена полости рта
- 4) эндодонтическое лечение
- 5) удаление зубов, которые нельзя сохранить

109. Рентгенологические признаки деструкции кости можно определить, если

Номер правильного ответа: 4

- 1) правильно выполнен снимок и проявлена пленка
- 2) в периапикальной области имеется резорбция губчатой кости
- 3) проявку выполнит с контролем времени и температуры
- 4) происходит резорбция внутренней или наружной кортикальной кости
- 5) исследование проведено с помощью радиовизиографии

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

110. Наиболее широко приемлемым внутриканальным ирригантом имеющим оптимальные очищающие и бактерицидные свойства, является

Номер правильного ответа: 4

- 1) формакрезол
- 2) перекись водорода
- 3) стерильный физраствор
- 4) гипохлорит натрия
- 5) хлоргексидин

111. Проверка проходимости канала (рекапитуляция) это

Номер правильного ответа: 5

- 1) последовательное использование инструментов возрастающих размеров для расширения канала
- 2) удаление дентинных опилок инструментом меньшего размера, чем окончательный инструмент для обработки апикальной части канала в сочетании с обильной ирригации
- 3) использование файла № 35 для очистки апекса
- 4) опиливающие движения Н — файла
- 5) использование flexo- инструментов

112. Инструмент используемый при пломбировании корневых каналов методом латеральной конденсации холодной гуттаперчи

Номер правильного ответа: 5

- 1) плагер
- 2) ример
- 3) лентуло
- 4) корневая игла
- 5) спредер

113. Инструмент используемый при пломбировании корневых каналов методом вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи

Номер правильного ответа: 5

- 1) лентуло
- 2) файл № 35
- 3) зонд
- 4) спредер
- 5) плагер

114. Основные требования, предъявляемые к материалам для пломбирования корневых каналов

Номер правильного ответа: 3

- 1) легко вводится в корневой канал
- 2) обладать медленным отверждением
- 3) не обладать токсическим, аллергенным, мутагенным и канце-рогенным действием
- 4) не окрашивает ткани зуба
- 5) при необходимости легко извлекаться из канала

115. Эпоксидным является

Номер правильного ответа: 5

- 1) Endomethasone
- 2) Ketac - Endo
- 3) Apexin
- 4) Sealapex
- 5) AH - 26

116. При отсутствии реакции на ток 100 мкА можно предположить

Номер правильного ответа: 3

- 1) средний кариес
- 2) интактный зуб
- 3) хронический периодонтит
- 4) гангренозный пульпит
- 5) глубокий кариес

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

117. При остром гнойном периодонтите преобладают микроорганизмы

Номер правильного ответа: 4

- 1) аэробы
- 2) ассоциации аэробов и факультативных анаэробов
- 3) ассоциации аэробов и облигатных анаэробов
- 4) ассоциации факультативных и облигатных анаэробов
- 5) факультативные анаэробы

118. Наиболее оптимальным для закрытия перфорации корня является

Номер правильного ответа: 3

- 1) фосфат-цемент
- 2) стеклоиономерные цементы
- 3) Pro Root МТА
- 4) серебряная амальгама
- 5) препараты на основе гидроокиси кальция

119. В состав корневых силеров вводится гидроокись кальция

Номер правильного ответа: 3

- 1) для рентгеноконтрастности
- 2) для стимуляции дентина — цементогенеза
- 3) для стимуляции остеогенеза
- 4) для противовоспалительной терапии
- 5) для адекватной биосовместимости материала

120. Укажите основные свойства комплексонов или хелатных веществ, которые используются при инструментальной обработке корневых каналов

Номер правильного ответа: 2

- 1) антисептическое действие
- 2) декальцинация дентина
- 3) увлажнение канала
- 4) усиление режущих свойств эндодонгических инструментов
- 5) противовоспалительное действие

121. Решающий тест при дифференциальной диагностике острого периодонтита и острого пульпита постоянного сформированного зуба

Номер правильного ответа: 2

- 1) перкуссия
- 2) электроодонтодиагностика
- 3) характер болей
- 4) термометрия
- 5) рентгендиагностика

122. Из перечисленных некариозных поражений зубов возникают после их прорезывания

Номер правильного ответа: 1

- 1) травма, эрозия, клиновидный дефект
- 2) флюороз зубов
- 3) гипоплазия эмали
- 4) гиперплазия эмали
- 5) наследственные нарушения развития зубов

123. Назовите формы клинического проявления гипоплазии эмали

Номер правильного ответа: 5

- 1) пятнистая
- 2) штриховая, чашеобразная
- 3) эрозивная
- 4) бороздчатая
- 5) все перечисленные

124. При диф. диагностике кариеса в стадии пятна и флюороза решающим является

Номер правильного ответа: 5

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

- 1) локализация процесса
- 2) симметричность поражения
- 3) консистенция поверхности пятна
- 4) прогрессирование процесса
- 5) системность поражения

125. Пятнистую форму системной гипоплазии следует дифференцировать

Номер правильного ответа: 2

- 1) пятнистой формой флюороза и местной гипоплазии, кариесом в стадии пятна
- 2) поверхностным кариесом
- 3) штриховой формой гипоплазии
- 4) штриховой формой флюороза
- 5) меловидно-крапчатой формой флюороза

126. Нормальная частота пульса взрослого человека в пределах:

Номер правильного ответа: 2

- 1) 40-80 ударов в минуту
- 2) 60-100 ударов в минуту
- 3) 80-120 ударов в минуту
- 4) 90-130 ударов в минуту
- 5) 100-140 ударов в минуту

127. Частота дыхания в минуту взрослого человека находится в пределах:

Номер правильного ответа: 2

- 1) от 10 до 14
- 2) от 14 до 20
- 3) от 16 до 24
- 4) от 24 до 28
- 5) от 26 до 50

128. При обследовании пациента обязательно пальпируется бимануально следующая область:

Номер правильного ответа: 5

- 1) преддверие полости рта
- 2) слизистая оболочка щеки
- 3) контуры губ
- 4) уздечка языка
- 5) дно полости рта

129. При проведении электроодонтодиагностики больного зуба целесообразно начать измерение:

Номер правильного ответа: 4

- 1) сразу с причинного зуба
- 2) с антагониста
- 3) с подобного зуба на противоположной челюсти
- 4) с такого же зуба на противоположной стороне зубной дуги
- 5) с любого другого зуба

130. При проведении внешнего осмотра пациента с острым периодонтитом 4б обращают внимание на: 1 состояние кожных покровов; 2 состояние лимфатических узлов; 3 конфигурацию лица; 4 глубину дыхания; 5 состояние жевательных мышц. Выберите правильный ответ по схеме:

Номер правильного ответа: 1

- 1) если правильны ответы 1, 2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5

131. В дифференциальной диагностике пульпита и периодонтита используется: 1 перкуссия зуба; 2 температурная проба; 3 ЭОД; 4 зондирование полости зуба; 5 рентгенография. Выберите правильный ответ по схеме:

Номер правильного ответа: 5

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

132. У пациентов с склонностью к кровотечениям предпочтение нужно отдавать следующим видам анестезии:

Номер правильного ответа: 3

- 1) ментальной
- 2) мандибулярной
- 3) подслизистой
- 4) инфраорбитальной
- 5) резцовой

133. Развитию передозировочных реакций на местные анестетики у больных с: кардиологическими заболеваниями способствует: 1. снижение сердечного выброса; 2. уменьшение объема циркулирующей крови; 3. снижение печеночного кровотока; 4. настроение пациентов; 5. уменьшение скорости всасывания анестетика из места инъекции. Выберите правильный ответ по схеме:

Номер правильного ответа: 1

- 1) если правильны ответы 1,2 и 3
- 2) если правильны ответы 1 и 3
- 3) если правильны ответы 2 и 4
- 4) если правильный ответ 4
- 5) если правильны ответы 1,2,3,4 и 5

134. Лечение больных с выраженной сердечной недостаточностью нужно проводить:

Номер правильного ответа: 2

- 1) в горизонтальном положении
- 2) в полугоризонтальном положении
- 3) в вертикальном положении
- 4) в горизонтальном положении с приподнятыми ногами
- 5) не проводить лечение

135. Указание на инфаркт миокарда, перенесенный менее 6 месяцев назад или повторный инфаркт миокарда делает проведение местной анестезии:

Номер правильного ответа: 2

- 1) абсолютно противопоказанным
- 2) показанным по экстренным показаниям, в сочетании с премедикацией
- 3) показанным без ограничений
- 4) показанным с применением вазоконстрикторов
- 5) не проводить лечение

136. У пациентов с гипертензией выше 200/115 стоматологические вмешательства с применением анестетиков:

Номер правильного ответа: 4

- 1) проводятся в обычном порядке в условиях поликлиники
- 2) противопоказаны
- 3) проводятся по экстренным показаниям в условиях поликлиники
- 4) неотложные вмешательства проводятся в стационаре
- 5) проводятся в обычном порядке в стационаре

137. Препарат для коррекции психоэмоционального состояния:

Номер правильного ответа: 1

- 1) транквилизаторы
- 2) спазмолитики
- 3) анальгетики
- 4) антигистаминные препараты
- 5) антибиотики

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

138. Препарат для предупреждения развития нейроциркуляторой дистонии по гипотоническому типу при проведении премедикации:

Номер правильного ответа: 2

- 1) транквилизаторы
- 2) м - холинолитики
- 3) анальгетики
- 4) антигистаминные препараты
- 5) антибиотики

139. Для купирования (торможения) аллергических реакций при проведении премедикации применяют:

Номер правильного ответа: 4

- 1) транквилизаторы
- 2) спазмолитики
- 3) ненаркотические анальгетики
- 4) антигистаминные препараты
- 5) антибиотики

140. Признаки, выявленные при обследовании пациента (потеря сознания; бледные, влажные кожные покровы; гипотония; редкое, поверхностное дыхание) характерны для:

Номер правильного ответа: 2

- 1) эпилепсии
- 2) обморока
- 3) анафилактического шока
- 4) гипогликемии
- 5) коллапса

141. Среди причин возникновения обморока нехарактерной является:

Номер правильного ответа: 4

- 1) психогенная реакция
- 2) болевое раздражение
- 3) гипервентиляция
- 4) нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу
- 5) потеря воды и натрия вследствие рвоты и поноса

142. Патогенетическая терапия коллапса предполагает:

Номер правильного ответа: 5

- 1) урежение частоты сердечных сокращений
- 2) уменьшение объема циркулирующей крови
- 3) понижение тонуса сосудов
- 4) снижение сократительной способности миокарда
- 5) сужение периферических сосудов

143. Горизонтальное положение оптимально при:

Номер правильного ответа: 4

- 1) гипервентиляции
- 2) асфиксии
- 3) гипергликемии
- 4) коллапсе
- 5) приступе бронхиальной астмы

144. Маловероятной Причиной возникновения гипертонического криза является:

Номер правильного ответа: 5

- 1) гипертоническая болезнь
- 2) поражения почек
- 3) поражение ЦНС
- 4) поражение системы крови
- 5) нарушение функции антиноцицептивной системы

Тесты на аттестацию. Стоматология терапевтическая. Вторая категория.

145. У пациента наблюдается быстрое повышение АД, резкая головная боль, рвота, дрожь во всем теле, тахикардия. Имеет место:

Номер правильного ответа: 4

- 1) приступ стенокардии
- 2) коллапс
- 3) гипогликемия
- 4) гипертонический криз
- 5) инфаркт миокарда

146. Длительность приступа стенокардии составляет:

Номер правильного ответа: 2

- 1) 10 -30 секунд
- 2) 30 - 60 секунд
- 3) 1 - 5 минут
- 4) 5 - 10 минут
- 5) 10 - 15 минут

147. Противопоказания для проведения местной анестезии на амбулаторном стоматологическом приеме:

Номер правильного ответа: 2

- 1) наличие сопутствующего заболевания - сахарный диабет
- 2) непереносимость местного анестетика
- 3) возраст старше 50-ти лет
- 4) наличие сопутствующего заболевания - гипертоническая болезнь (систолическое давление крови более 160мм рт ст)
- 5) разлитой гнойный очаг в мягких тканях лица

148. Основным местным фактором риска возникновения катарального гингивита является:

Номер правильного ответа: 2

- 1) наследственность
- 2) наличие микробного налета
- 3) вредные привычки
- 4) подвижность зубов
- 5) наличие эндокринной патологии

149. Профилактике воспалительных заболеваний пародонта в большей мере способствует:

Номер правильного ответа: 2

- 1) прием фторидсодержащих препаратов
- 2) проведение профессиональной гигиены
- 3) реминерализирующая терапия
- 4) уменьшение употребления углеводов
- 5) прием витаминов

150. При пальпации поднижнечелюстных лимфатических узлов голова пациента должна быть:

Номер правильного ответа: 4

- 1) отклонена назад
- 2) отклонена влево
- 3) отклонена вправо
- 4) наклонена вперед
- 5) отклонена назад и влево